

Osservazioni sul genere *GRISEBACHIA* W. et D.

Il genere *Grisebachia* W. et Dr. creato per due specie di Palme dell'Isola Lord Howe, per varii caratteri si ravvicina moltissimo al genere *Linospadix*, ma non avendo esaminato esemplari di nessuna delle due specie, non posso farmi un'idea esatta delle differenze indicate dai Sigg. W. e Dr.; soltanto faccio notare che il genere *Grisebachia* di Klotzsch fra le *Ericaceæ* essendo stato adottato dai Sigg. Bentham ed Hooker nel loro « *Genera plantarum* » non può continuare a figurare fra le Palme. Quando sia quindi ben constatato che la *Kentia* (*Grisebachia* W. et Dr.) *Belmoreana* Moore et Muell. e la *K.* (*Grisebachia* W. et Dr.) *Forsteriana* Moore et Muell. non possano rientrare fra i *Linospadix*, occorrerebbe per queste 2 specie trovare un nome generico nuovo, ed io propongo intanto quello di *Howeia*, che rammenterebbe così l'Isola dove esse crescono.

Genus *HOWEIA* Becc.

GRISEBACHIA H. W. et O. Dr., in *Linn. V. p. 177 et 200.* — *Drude in Nachrichten v. d. K. Gesel. d. Wiss. z. Göttingen, 1875, p. 54 sqq.* — *KENTIA* (partim) Moore et Muell. in *F. van Mueller. Fragm. VII, pag. 99 sqq.*

(1). *HOWEIA BELMOREANA* — *KENTIA BELMOREANA* M. et M. l. c. (cum icone).
— *GRISEBACHIA BELMOREANA* W. et Dr. l. c. et tab. IV, fig. 1.

Abita. — Isola Lord Howe, a circa 300 metri sul livello del mare; fu raccolta dai Sigg. Moore e Carron.

(2). *HOWEIA FORSTERIANA* — *KENTIA FORSTERIANA* M. et M. l. c. (cum icone).
— *GRISEBACHIA FORSTERIANA* W. et Dr. l. c. et tab. IV, fig. 2.

Abita. — Isola Lord Howe con la specie precedente.

Genus VIII. *SOMMIERIA* Becc.

Spadices interfrondales elongati apice digitato-ramosi. Spathæ 2 completæ, altera (infera) longe tubulosa, altera remota sub ramis inserta bipartito-lacera. Glomeruli triflori in scrobiculis spiraliter dispositi. Flores ♂ symmetrici; sepala imbricata; petala valvata; stamina 6, filamentis elongatis apice inflexis (semper?), antheris sagittatis versatilibus. Ovarii rudimentum . . . Floris ♀ sepala et petala imbricata subconformia; staminum rudimenta parva; ovarium; stigmata 3 crassiuscula reflexa, ovulum (basilare?). Drupæ sphaericæ, pericarpio suberoso, superficie tessellato-areolata, areolis irregulariter pyramidatis obtusis, endocarpio crustaceo fragili. Semen liberum basilare; raphe e base ramos 3-4 ascendentes emittens. Albumen æquabile. Embrio basilaris. Palmæ Papuanæ humiles elegantissimæ foliis flabellato-cuneatis furcatis.