

Nordwestl. Niederländisches-Neuguinea: Amberbakin (Beccari, non vidi).

4. **Hydriastele Geelvinkiana** (Becc.) Burret nov. comb. — *Nenga Geelvinkiana* Becc. Malesia I (1877) 28; — *Adelonenga Geelvinkiana* Becc. in Ann. Jard. Bot. Buit. II (1885) 82.

Nordwestl. Niederländisches-Neuguinea: Insel Miosnom in der Geelwink-Bai (Beccari, non vidi).

5. **Hydriastele microspadix** (Becc.) Burret nov. comb. — *Kentia microspadix* Warb. in Schum. et Lauterb. Fl. Deutsch. Schutzgeb. Südsee (1901) 26 nomen tantum. — *Adelonenga microspadix* (Warb.) Becc. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 26.

Nordöstl. Neuguinea: Hatzfeldhafen (Warburg! Lauterbach!). Sepik (Lederermann).

6. **Hydriastele Kasesa** (Lauterb.) Burret nov. comb. — *Ptychosperma Kasesa* Lauterb. in Engl. Bot. Jahrb. XLV (1911) 357. — *Adelonenga Kasesa* (Lauterb.) Becc. (errore *Rasesa*) in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 26, in Martelli in Nuovo Giorn. Bot. Ital. Nuov. Ser. XLII (1935) 19.

Neu-Mecklenburg: Namatanai, Urwald bei Nabumai. Stämme in Gruppen von 10—30 (Peekel n. 109).

7. **Hydriastele rostrata** Burret nov. spec. „Caudices caespitosi, usque 10 pedes alti, 2½—3 pollices in diam. Petiolus 12—15 pollices longus. Lamina 3—4 pedes longa.“ Rhacheos fragmentum medium visum triangulare, subtus fusco-furfuraceum, demum utrinque minutissime fusco-punctulatum, segmenta valde irregulariter sequentia vel ad 2—3 dense aggregata gerens. Segmenta robusta, i. s. supra viridia, subtus nonnihil pallidiora, conspicue latiuscule cuneata, recta, plerumque costa primaria unica atque nervo secundario utrinsecus unico a margine remoto percursa, marginibus tenuibus, raro segmentum nervis primariis 2 percursum. Segmenta circ. 40 cm longa, primario unico percursa, in dimidia parte ad 4 cm circ. lata, omnia apice oblique praemorsa, margine superiore producto, in costa media subtus inferne paleis linearibus in dimidio affixis praedita. Spadix duplicato-ramosus, cernuus. Spatharum annuli 1 cm vix dissiti. Pedunculus 3,5 cm longus. Rhachis perbrevis. Rami circ. 20 et forsitan ultra (partim visi). Rami primarii haud numerosi, ramos fructiferos secundarios plures, rami primarii superiores paucos sat dense insertos exserentes. Rami fructiferi longiores 35 cm fere longi, glabri, sat graciles, fructibus decussatis, in inter-