

plerumque tenuiores. Frondis vagina anguste cylindrica, longa, longitudinaliter dense costata, juniores punctulato-maculato-fusco-leprosaе. Petiolus perbrevis, 3 cm longus, apice 5 mm latus. Lamina rigida, simplex, ambitu elongato-obovata, modice infra dimidiam bipartita, 46 cm circ. longa, superne 21 cm circ. in diam., basi latiuscule, sat subito cuneata. Rhachis 19 cm longa, subtus ut vagina junior et petiolus punctulato-fusco-leprosa, apice in filum exciens. Lobi angulum acutum includentes, oblongo-lanceolati, ab angulo circ. 28 cm longi, basi 7 cm et paulo ultra in diam., apice breviter, anguste acuminati, superne vix conspicue incurvi. Nervi primarii utrinsecus 12, dense sequentes. Inter illos tenuiores pauci et tenues numerosi. Facies praesertim subtus saepe granulosa vel breviter transverse elevato-lineolata. Spadix parvus, 23 cm longus. Pedunculus 5,5 cm longus, spatharum annulis 2. Rhachis 11 cm longa, simpliciter ramosa, ramis 20, tenuibus, a basi jam leviter undulatis, basi bractea lanceolata, anguste acuminata suffultis, 10,5—6 cm longis. Florum triades spiraliter inserti. Flores ♂ cum pedicello ad 1 mm longo 3 mm longi. Petala lanceolata. Fructus immaturi (7 mm alti visi), lanceolati, basi curvati. Perianthium in statu viso 2 mm altum. Calyx 3-lobus, 1 mm altus. Petala ovata. Stigmata ad petalorum apicem inserta.

Colombia: Cauca, über dem Rio Dagua, bei Los Cornos, 1200 m. In dichten, feuchten Gebirgswäldern. Die Stämme, selten Fingerstärke erreichend, zahlreich von einem Wurzelrasen entstehend, bis 3 m hoch. Die Laubblätter, robust, dunkelgrün, sind in einer schönen Blattrosette, horizontal stehend geordnet (22. Sept. 1882 — F. C. Lehmann Nr. 1957).

Die einzige Art mit ungeteilten Wedeln. Der Kolben ist relativ klein.

Hyospathe Lehmannii Burret nov. spec. — „Caudices tenues, usque 3 m alti.“ Petiolus sat robustus, 30 cm circ. longus, ut rhachis dense fusco-punctulato-leprosus. Rhacheos partes 2 visae, infima 26 cm longa, segmentis utrinsecus 5 regulariter dispositis, infimo nervis primariis 3 percurso, ad 3,5 cm lato, reliquis omnibus uninnerviis, 1,5 cm latis, suprema 32 cm longa, segmentis utrinsecus 6—7 regulariter insertis, segmento infimo in quoque latere nervis primariis 2—3 percurso, 4—3 cm fere lato, reliquis praeter apicalia primario unico, apicem rhacheos versus gradatim angustiora, apicalia latiora, nervis primariis 3—4 percursa. Rhachis apice in filum exiens. Segmenta linearia, leviter falcata, anguste acuminata, sat rigida, i. s. atroviridia, subtus paulo pallidiora, inter nervos primarios nervis

validioribus saepe 2 et tenuioribus sat numerosis, utrinque conspicuis, subtus in nervis nervulisque paleis minutis, badiis, sat densis praedita. Spadix 50 cm longus, ramis circ. 10 et ultra, longis. Pedunculus 13 cm longus, spatharum annulis 2. Rhachis 10 cm circ. longa. Rami sat tenues, superne undulati, longissimi 33 cm longi. Florum triades spiraliter dispositi, flores ♂ breviter pedicellati, sub anthesi i. s. cum pedicello 1 mm circ. longo ad 5 mm longi. Calycis lobi sat breves, rotundato-triangularis. Petala fere linearia, 3,5 mm longa, 1 mm vix lata, apice rotundata, nervis longitudinalibus sat densis. Stamina circ. 3 mm longa, filamentis longis, primo tortis. Antherae oblongae, 1 mm vix aequantes. Flores ♀: Calyx breviter 3-lobus. Petala ovata.

Colombia: Bei Buenaventura, an der Küste, zwischen Gesträuch. Stämme dünn, bis 3 m hoch. Laub matt stahlgrün. Blütentraube dunkelrot. Blüten weiß (blühend 29. Juli 1880 — F. C. Lehmann Nr. 4).

Die Art erinnert an *H. gracilis* H. Wendl. insofern, als bei ihr die meisten Fiedern nur von einem Primärnerven durchzogen sind. Im Gegensatz zu der genannten sind jedoch bei *H. Lehmannii* die Fiedern unterseits auf der Nervatur mit zahlreichen kleinen, braunen Schuppen versehen. Auch ist der Kolben bedeutend größer.

Catostigma Dryanderæ Burret nov. spec. — Palma circ. 7 m alta. Petiolus 31 cm longus, validissimus, subteres. Lamina 1,35 cm longa, segmentis circ. 24, ut videtur, spatiis sat regularibus dispositis, sed superioribus tantum horizontaliter pertensis, reliquis surrectis vel irregulariter abeuntibus. Segmenta rigida, indivisa, et subtus, ut videtur, glabra, apicalia fere omnino connata, apice rotundato-praemorsa, reliqua oblique praemorsa, pro rata late, maxima fere deltoideo-cuneata, usque 42 cm longa, 17 cm lata. Spathae 5, 24 cm longae, infima vix 3 cm longa, secunda 5 cm, tertia 10 cm supra spadice basin altitudine aequantes, summae ambo fere aequaltae, lanceolato-oblongae, apice acutae, lateraliter apertae, reliquae apice apertae multidentatae, omnes extus decidue furfuraceae, pilis carentes. Spadix ramis paucis, 3—4, cernuis, leviter curvatis. Flos ♀ post anthesin vel fructus juvenis: Calyx irregulariter 3-lobus, lobis late ovatis, obscure paucinerviis. Petala lineari-lanceolata, acuta, 4 mm longa, dense, distinctissime, valide longitudinaliter nervosa. Carpidium unicum fertile lanceolatum, fusco-furfuraceo-granulosum, ad cujus basin sterilia 2 et stigmata 3 linearia inserta. Spadix fructifer: Pedunculus 14 cm longus. Rhachis 5,5 cm longa. Rami 4, longi, cernui, 30 cm circ. longi, glabrati, dense albido-granulosi. Fructus