

Hiermit ist sicher identisch Material einer fruchtenden Palme vom gleichen Standort n. 2521. Das Stämmchen ist hier mit 2 m Länge angegeben.

Ein Kolben einer männlichen Pflanze n. 2523 unter gleicher Standortsangabe mit einer Skizze des schräg aufsteigenden Stämmchens stimmt völlig mit der als Typus beschriebenen n. 2614 überein.

Hyospathe macrorhachis Burret nov. spec. — „Caudex 0,8 m altus.“ Petioli fragmentum visum 11 cm longum, ad apicem 3 mm vix in diam., ut rhachis decidue fusco-leproso-lepidotum. Rhachis 30 cm circ. longa: Lamina tenuis, fragilis, circ. 60 cm longa, i. s. supra nigra, subtus pallidior, basi latiuscule cuneata, nervis primariis utrinsecus 16, plerumque, ut videtur, in utroque latere segmentis 2—3. Segmenta porrecta, lineari-lanceolata, ad apicem falcata, praecipue infima longe anguste acuminata, summum in margine superiore circ. 30 cm longum. Angulus segmentis apicalibus inclusus peracutus. Spadix tenuis, gracilis, longe pedunculatus, pedunculus incompletus 32 cm longus, spatha tenui pedunculum 3,5 cm superante anguste vaginatus. Rhachis 18 cm longa, tenuis. Rami 18, valde remote inserti, tenuous, breves, maximi 4,5—5 cm tantum longi, superne paululo undulati, superiores 2,5 cm vel vix longitudine aequantes. Florum glomeruli in spira laxa dispositi, flore ♂ unico supra femineum inserto, ramorum apicem versus floribus ♂ solitariis. Fructus circ. oblongo-cylindrici, 11 mm longi, 5 mm vel fere in diam., apice obtuso-rotundati, basi leviter acutiuscule stipitati. Pericarpium tenue, fibris tenuibus densis longitudinaliter percursum. Stigmata supra fructus basin inserti. Perianthium fructiferum fere explanatum. Calyx connatus, basi subscutelliformis, 3-lobatus, inter dentes 2,5 mm in diam. Corolla explanata, inter apices 4,5 mm in diam., lobis late ovatis, breviter acutiuscule contractis.

Ost-Ecuador: Mera, Pastaza, primärer Sumpfwald, ca. 1000 m, Stamm 0,8 m. Fruchtstand karminrot, Früchte schwarz (7. Sept. 1938 — Hertha Schultze-Rhonhof n. 2789).

Die Art unterscheidet sich von allen anderen durch die langgestreckte Rhachis des Kolbens mit sehr kurzen, in weitem Abstand folgenden Ästen. Die Wedel sind wenig geteilt, unregelmäßig zweibis dreijochig. Die Zahl der Primärnerven ist auffallend gering, geringer als die der meisten Arten. Es handelt sich also um eine recht ausgeprägte Art.

Euterpe microspadix Burret nov. spec. — Ex icone caudices 3 ejusdem validudinis atque frondes juveniles 3 prob. ex eodem rhizomate ortae. „Caudex usque 8 m altus, 7 cm in diam. (ex icone annulis dissitis). Frondes usque 2 m longae.“ Petiolus 50 cm longi-