

IRIARTEA. Ruiz et Pavon.

1. Iriarteia philonotia. — Radices extraterranæ; stipes cylindricus æqualis. Frondes patentes; foliola subtrapezoidea ad basim et lacinias linearibus ad verticem divisa, oblique erecta, crispa, apice recurvo, omnia sinuato-dentata: baccæ obovatæ, depressæ, olivaticoluteæ.

Hab. *In silvis udis prope Obidos in Provincia Paraensi et ad fluvium Jamundá. Fructus maturescunt mense januario.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 345).

Radices 8-12 contemporanea, 1^m,15 longæ, diametro 0^m,035. Stipites longit 10-12^m. diametro 0^m,01. Folia 7-8 contemporanea, 4-5^mlonga, (vagina inclusa).

2. I. Spruciana. — Stipes mediocris, inermis, ad acumen tomento setoso instructus. Frondes semipatentes, curvatæ; petiolum invaginans (vagina tomento setoso deciduo); foliola cuneiformia, rhomboidea, spadix ramosus; spathæ numero 4. Drupa obovata, cylindræa, incurva et ad basim semi-globosa rubescens.

I. PRURIENS. *Spruce. En. Palm. jour. Lim. Soc. Vol. VI. pag. 135.*