

LEPIDOCARYUM. Mart.

1. *Lepidocaryum enneaphyllum*. — Stipite cæspitose erecto, 3-4^m alto; frondibus flabelliformi-pinnatifidis; foliolis constanter 9 ab altero, quorum bina extrema connexa et nervuris ciliatis et marginibus.

Hab. in regione ad cataractas fluviorum Trombetas et Jamundá et fructus gignit m. Martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 329)

Stipes 3^m,5 altus, diametro 0^m.02. Folia 12-15 contemporanea; petiolus 0^m,08 longus.

2. *L. sexpartitum*. *Trail.* et *Barb. Rod.* Caudice 4-8 pedale, diametro 3/10-1/2 pollicari, foliis quindecim 3 pedibus, flabelliformibus 6-partitis, (juvenum plantarum 4 partitis) laciniis lanceolatis, ad venas et margine extimos setoso-ciliatis. Baccis fere pollicaribus oblongis vix obovatis, abrupte cuspidatis, squamulis fere rhombus rufis, apice nigro ciliato.

Hab. ad cataractas fluvii Tapajós, ubi eam invenit sine fructibus mense junio. Postea amicus Dr. James Trail exemplar apud Aveiros repertum mihi ostendit.