

## LEPIDOCARYUM. Mart.

1. *Lepidocaryum enneaphyllum*. — Stipite cæspitose erecto, 3-4<sup>m</sup> alto; frondibus flabelliformi-pinnatifidis; foliolis constanter 9 ab altero, quorum bina extrema connexa et nervuris ciliatis et marginibus.

**Hab.** in regione ad cataractas fluviorum Trombetas et Jamundá et fructus gignit m. Martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 329)

Stipes 3<sup>m</sup>,5 altus, diametro 0<sup>m</sup>.02. Folia 12-15 contemporanea; petiolus 0<sup>m</sup>,08 longus.

2. *L. sexpartitum*. *Trail.* et *Barb. Rod.* Caudice 4-8 pedale, diametro 3/10-1/2 pollicari, foliis quindecim 3 pedibus, flabelliformibus 6-partitis, (juvenium plantarum 4 partitis) laciniis lanceolatis, ad venas et margine extimos setoso-ciliatis. Baccis fere pollicaribus oblongis vix obovatis, abrupte cuspidatis, squamulis fere rhombus rufis, apice nigro ciliato.

**Hab.** ad cataractas fluvii Tapajós, ubi eam invenit sine fructibus mense junio. Postea amicus Dr. James Trail exemplar apud Aveiros repertum mihi ostendit.