

13. **L. Gjellerupii** Becc. sp. n. — Robusta. Foliorum lamina ampla, multipartita, segmentis numerosis cuneatis. Spadix amplus, inflorescentiis partialibus paniculaeformibus, multirameis, ramis pilosis. Flores super tuberculos prominentulos inserti, vulgo solitarii, 4 mm. longi; calyce cyathiformi-campanulato, piloso; corolla calyce nonnihil longiori, lobis crassiusculis triangularibus; urceolo staminali paullo ultra corollae faucem prominenti, conspicue 3-lobo, lobis latis, cucullatis, profunde bipartitis; antheris parvis ovato-ellipticis, introflexis. Statura, foliis et spadice *Licualae Lauterbachii* similis, differt structura florum, et praecipue urceoli lobis cucullatis, antheras reflexas obtegentibus.

Nuova Guinea olandese boreale; raccolta da Gjellerup (n.º 91) al Biwak Hollandia, durante la Deutsch Niederl. Grenzexp. in New-Guinea, 1910.

14. **L. grandis** H. Wendl. in Illustr. Hort. XXVI (1880) 23, t. 412. — *Pritchardia grandis* Hort.

Nuova Brettagna.

15. **L. naumoniensis** Becc. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 39.

Nuova Guinea olandese boreale, sulle sponde del fiume Mamberan.

16. **L. oninensis** Becc. sp. n. — *L. telifera* Becc., Malesia, 1, 81 (ex parte). — Gracilis, foliorum segmenta pauca (9) ab extremo apice deorsum sensim cuneata, segmento medio profunde bifido. Spadix brevis, spathis rubiginoso-furfuraceis, subinflatis; inflorescentiis partialibus paucis. Flores 3,5 mm. longi, calyce minute piloso, obconico-campanulato, membranaceo, obtuse 3-lobo; annulo staminali membranaceo, 6-lobo, lobis alternipetalis quam oppositipetalis majoribus; filamentis brevibus, setiformibus, subbiseriatis.

Nuova Guinea olandese austro occidentale a Kulokadi, presso Karas (*Becc.*).

17. **L. bellatula** Becc. in Nuova Guinea, Rés. Exped. Scient. Néerl. VIII (Botany) 215, t. L, III.

Nuova Guinea olandese meridionale, sul Noordrivier.

18. **L. debilis** Becc. in Nuova Guinea, Rés. Exped. Scient. Néerl. VIII (Botany) 216, t. L. I.