

Borneo in Sarawak sul M. Mattang (*Becc.*, P. B. n.° 1379).

45. **L. bidentata** *Becc.*, Malesia, III, 80. — *L. elegantissima* Ridley in Gard. Chr. XXV (1904) 50.

Borneo in Sarawak: sul M. Santubong e sul M. Mattang (*Becc.*); a Kalaka (*Ridley*, n.° 11848 nell'Erb. di Kew).

46. **L. spinosa** Wurmb in Ver. Bat. Genootsch. II, 469. — *L. ramosa* Bl. in Schult. Syst. Veg. VII, 1303. — *L. horrida* Bl. Rumphia, II, 41, t. 89, f. 1.

Specie assai diffusa nei luoghi paludosi presso il mare, nella Penisola malese, in Singapore, in Giava, in Sumatra e nelle Filippine.

L. spinosa var. **eriantha** *Becc.* var. n. — Flores ovati, calyce pilis crispis dense induto; corollae lobis appresse pilosis; ovario glabro.

Birmania a Wagou in Tavoy (*Meebold*, n.° 15086 nell'Erb. di Breslavia).

L. spinosa var. **cochinchinensis** *Becc.*, Malesia, III, 74. — *L. spinosa* subv. *brevidens* *Becc.*, Malesia, III, 75. — *L. pilearia* Bl. Rumphia, II, 42.

Nella Cocincina meridionale sul M. Dai, prov. di Chaudoc, ed a Songlu, prov. di Bien-hoe (*Pierre*) e probabilmente altrove in Indo-China ed anche nel Siam.

47. **L. merguensis** *Becc.* sp. n. — Mediocris. Foliorum segmenta circiter 9, cuneata; extima apice oblique truncata; intermedia 30-40 cm. longa, 4-5-costulata, 5-7 cm. lata, apice horizontaliter truncata et breviter lobulata; segmento mediano manifesto pedicellato. Spadicis inflorescentiae partiales in 2-3 ramulos floriferos brachiatos divisae; spathis superne inflatis, marcescentibus. Flores angusti, subelliptici, 5-6 mm. longi, 2-2,5 mm. crassi, glabri; calyce 3-lobo, lobis acuminatis; corolla quam calyx paullo longiori; annulo staminali elevato, membranaceo, truncato, filamentis brevissimis dentiformibus coronato; ovario turbinato, glabro, stylo elongato, subulato. Fructus sphaericus, 10-11 mm. diam.; semine processu recto subcylindraco perfosso.

Birmania: a Maunglow in Mergui (*Meebold*, n.° 14238 nell'Erb. di Breslavia).