

Borneo in Sarawak, presso il mare a Bintulu.

29. **L. flabellum** Mart. Hist. Nat. Palm. III, 237 et 318.

Celebes (*Reinwardt*).

30. **L. Kunstlerii** Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI, 438.

Penisola malese nel Distretto di Perak.

31. **L. acutifida** Mart. Hist. Nat. Palm. III, 236 (excl. syn. Roxb.) t. 135, III, IV.

Isole di Pinang e Singapore.

L. acutifida Mart. v. **peninsularis** Becc. var. n. — A forma typica differt foliorum segmentis inaequalibus, centralibus 3-costulatis, in parte apicali quam infra latoribus. Petiolus fere usque ad apicem spinosus. Flores super tubercolos vix prominulos insidentes.

Penisola malese: a Lumut in Dinding (*Ridley*, n.° 10239, esemplare tipico); a Bujong Malacca in Perak (*Ridley*, n.° 9806).

32. **L. Ridleyana** Becc. sp. n. — Mediocris. Foliorum lamina multipartita, segmentis latiuscule cuneatis. Spadix rigidus, 80 et ultra cm. longus, simpliciter ramosus, sive in spicas nonnullas (ad 5) superpositas caudiformes tomentosas, crassiusculas divisas, spathis elongatis, laxiuscule tubulosis. Flores crebre pluriseriati et super pulvinulos leviter depressos inserti, oblongi; calycis basi crassa, callosa, limbo membranaceo, truncato, irregulariter fisso, puberulo; corollae lobis crasse coriaceis, glabris; annulo staminali aequaliter 6-lobo, lobis latis, filamentis parvis, subulatis; ovario glabro, abrupte in stylum subulatum attenuato.

Penisola malese a Tapeh nello Stato di Perak (*Ridley*, n.° 14112 nell'Erb. di Berlino).

33. **L. densiflora** Becc. sp. n. — Parva. Foliorum petiolus basi tantum spinulosus, lamina digitatim paucisecta, segmentis 7 (in specimine uno) 24 cm. longis, 3-4 cm. latis, 3-5-costulatis, lateralibus in medio latoribus quam ad extremitates, medio cuneato. Spadix parvus, circ. 20 cm. longus (in specimine uno), simpliciter ramosus, sive in parpaucas (3) spicas, superpositas, densifloras, 3-5 cm. longas divisas; spathis chartaceis, apice leviter ampliatis. Flores congesti,