

Die Wedel erinnern ebenfalls atark an *Salacca*, die Fiedern sind sichelförmig am Ende und kaum merklich S-förmig gekrümmt, mit sehr lang vorgezogenen Spitzen, die obersten fließen, wie häufig bei *Salacca*, zusammen, haben aber freie Spitzen.

**Lophospatha borneensis** Burret nov. spec. — Frondis fragmentum apicale 43 cm longum visum. Rhachis 21 cm longa, tenuiter triangularis, inermis, decidue fusco-leprosa, segmentis apicalibus utrinsecus 4. Jugum apicale lobis circ. 5—5,5 cm latis, costis primariis 5—6 percursum, segmentis 5—6 confluentibus efformatum, apice lobulis 5—6 angustis, acuminatis, 4,5—2,5 cm fere longis, marginibus setosis. Segmenta reliqua 30 cm longa, 2,8 cm lata, supra i. s. atroviridia, nitentia, inermia, costis 3 validioribus percursa, quorum lateralibus a margine conspicue remotis, nervis transversalibus sat dense sequentibus, i. s. bene conspicuis, subtus brevissime dense albo-indutis, minutissime, dense fusco-lepidota, apice leviter sed conspicue falcata, longe, fere filamentoso-acuminata, usque ad summum apicem margines secus setosa, basi vix conspicue curvata. Spadicis rhacheos fragmentum superius inflorescentiam partialem gerens visum. Rhachis quoad visa nuda vel fere, spatha inflorescentiam partialem suffulciente rudimentaria. Inflorescentia partialis spicis 4 basi late breviterque conjunctis, in parte brevi communi dense fulvo-pilosi. Spicae 6,5—8 cm longae,  $\pm$  1 cm, compressae 1,3 cm latae, amentiformes. Spathellae i. s. fuscae, sat densae, sed cum spicis  $\sigma$  *Salaccae* comparatae laxiores, irregulares, multo tenuiores ideoque pressione irregulariter flexuosae, plicatae, lobis 2—3 acutis, acuminatis vel obtusis, densissime longitudinaliter nervosae, extus glabrae, intus floribus  $\sigma$  2—1 parvis, ex axilla prodeuntibus, bracteis lanceolatis tenuibus, superne sericeo-penicillatis suffultis. Flores  $\sigma$  6 mm longi, glabri. Calyx 4,5 mm longus, tenuis, dense longitudinaliter nervosus, inferne sensim attenuatus, in lobos 3 profunde fissus, lobis oblongo-oblanceolatis, apice rotundatis. Corolla inferne stipite robusto firmo nonnihil evoluto, superne petalis quam calyx nonnihil robustioribus, triangularibus. Stamina 6 filamentis superne subulatis. Antherae ovato-oblongae, dorso paulo infra dimidiam affixae. Fructus ignoti.

Borneo: Kinabalu, bei Dallas, 3000 Fuß. Blütenstand 2 Fuß, Wedel 4 Fuß, Infloreszenz rot, Blüten purpur-kremefarbig (J. et M. S. Clemens 1931/2 n. 26380 in herb. Berol.).

**Mauritiella macrospadix** Burret nov. spec. — Caespitosa, caudicibus circ. 6, aculeatis, usque 12 m altis, 10 cm circ. et ultra diam. metientibus, aculeis anguste conicis, acutissimis. Petiolus 1 m longi-