

Subgenus II. **Orophoma** Spruce in Journ. Linn. Soc. XI (1871) 171, Drude in Nat. Pff. III. II (1889) 43; — sub genere *Orophoma* Drude in Fl. Bras. III. II (1881) 294 (excl. *O. subinermi* [Spruce] Drude).

Stamina petalis anteposita cum iis inferne connata.  
Frondis vagina superne in fibras densas dissoluta.

6. **Mauritia Carana** Wallace.

Diese Art ist in der Folge ganz falsch beschrieben worden. Vergleiche hierzu meine Bemerkungen in Notizbl. Bot. Gart. Berlin X (1929) 568. Es liegen mir außer Wedelstücken zwar abgefallene männliche Blüten vor, aber leider kein Kolbenast, dagegen Fruchtäste mit unreifen und reifen Früchten. Letztere sind groß, kugelig mit mahagonibraunen Schuppen.

**Mauritiella** Burret nov. gen. — *Mauritia* spec. auct.

Palmae flabelliformes. Caudex inter minus validos vel tenuiores, saepe curvatus, saepe plures ex eodem rhizomate caespitosi, radicibus aculeatis simplicibus armatus. Frondes subtus ceraceo-albo-pruinosa. Spadix rhachi et ramis distichis, simplicibus, spathis et spathellis praeditis. Dioici. Flores ♂ et ♀ in amentis parvis, ♂ in seriebus pluribus, ♀ plerumque distiche dispositi. Stamina 6, quorum 3 petalis opposita eorum basi breviter adnata. Fructus majores vel plerumque minores squamis flavido-brunneis. Embryo ad seminis basin situs.

Typus generis: *Mauritiella aculeata* (H. B. K.) Burret.

1. **Mauritiella aculeata** (H. B. K.) Burret nov. comb. — *Mauritia aculeata* H. B. K. Nov. Gen. et Spec. I (1815) 311.

Hierzu gehören als Synonyme *Mauritia gracilis* Wallace und *M. limnophila* Barb. Rodr. Vergleiche die Bemerkungen unter *Mauritiella Duckei*.

2. **Mauritiella Duckei** Burret nov. spec. — Frondis, ut videtur, nondum omnino adultae vagina apicem versus lanceolata, ad apicem et margines versus leviter producta, integra, in fibras haud dissoluta; petiolus supra vaginae apicem 35 cm longus, teres, glaber vel glabratus, apice 2 cm in diam. metiens. Lamina, ut videtur, suborbicularis, in parte fere centrali 75 cm longa, in pinnis marginalibus vix brevior, profunde divisa, in semiflabello quoque basi indivisa in dimidia parte 8 cm, in marginali 4 cm fere longa. Segmenta 60, anguste linearia, longe attenuata et acuminata, latiora usque 2,2 cm lata, omnia supra viridia, subtus ceraceo-albo-pruinosa, in costa media supra inermia, subtus paleis laciniatis fuscis praedita, ad