

possiede i fiori a petali appendiculati; ma questo carattere è pure marcatissimo nella *Nenga Pinangoides* ed *affinis*, che hanno spadici con pochissimi rami semplici.

La lunghezza dei sepali dei fiori ♂ è variabilissima nelle varie specie; essi sono più lunghi dei petali nella *Nenga Wendlandiana*, ma in altre specie sono molto più corti, quantunque però siano sempre assai allungati.

Le foglie poi sono pure variabilissime, ed io non posso attribuire valore generico all'essere i segmenti acuminati o troncati, quando nella medesima fronda alcuni segmenti sono acuminati altri troncati. Ciò non ostante io credo dover conservare il nome di *Gronophyllum* per un sottogenere della *Nenga*. Se il carattere dei petali valvati nelle punte non lo avessi trovato variabile, avrei anch'io considerato questa particolarità come importante, tanto da autorizzare in causa di essa la creazione di un genere a parte. Si vedrà in seguito come questa diversità di fiori ♀ che si riscontra nelle varie specie di *Nenga*, si ritrovi nelle specie del genere *Kentia*, il quale assolutamente non differisce dalla *Nenga* che per il seme non ruminato. Le specie tanto di *Nenga* quanto di *Kentia* che hanno i fiori ♀ piramidali, ossia i petali appendiculati, sono facilmente riconoscibili anche quando sono fruttificate, perchè i petali si accrescono nel frutto e si rendono con le loro punte ordinariamente patenti assai conspicui.

Il D.^r Scheffer riporta al genere *Nenga* le seguenti 3 specie:

Nenga Wendlandiana (*Areca Nengah* Bl.)

..... *nagensis* (*Areca nagensis*, Griff.)

..... *latisecta* (*Pinanga latisecta* Bl.).

Forse vi si deve riportare anche l'*Areca gracilis* Roxb. (Griff. Palm. Brit. ind. tab. CCXXII, B).

Varie specie poi ancora inedite di Borneo mi sembra debbano far parte di questo genere; di esse però spero potermi occupare in seguito.

Riguardo alla distribuzione geografica, il genere *Nenga* così limitato, si estende dalla Penisola malese per Sumatra, Borneo, Giava, Selebes, fino alla Nuova Guinea.

Alla Nuova Guinea non è stata trovata sin qui alcuna specie di *Pinanga*, genere che rimane localizzato all'Arcipelago Indo-malese propriamente detto. Il D.^r Scheffer ne indica una specie nelle Molucche, che io non ho visto.

La posizione dell'ovulo quantunque sempre più o meno laterale non è costante nella *Nenga*; alcune volte l'ovulo pende dall'alto di un lato della loggia, altre volte quasi dalla base ed altre è attaccato alla loggia per quasi tutta la lunghezza. Il miglior carattere che distingue la *Nenga* dalla *Pinanga*, consiste appunto nella disposizione quadrifaria dei fiori; e poi nelle *Nenga* mai ho visto ovuli veramente basilari. La divisione è anche conveniente, perchè regionalizza in modo ben marcato le specie papuane dalle malesiane. Il genere *Pinanga* sarebbe esclusivamente Indo-malese, il *Nenga* Indo-malese-papua.

Prospetto delle specie del genere NENGA.

I. Subg. EUNENGA. — Flores ♀ globosi, petala imbricata. Sepala fl. ♂ elongata. Frondium segmenta apice acuminata vel inciso-dentata (Malesiacæ).

N. *Wendlandiana* (Bl.) Scheff.

..... *latisecta* (Bl.) Scheff.

..... *nagensis* (Bl.) Scheff.

..... *gracilis* (Roxb.) Becc.