

Sectio 2. **Leptophoenix** (Becc.) Burret nov. comb. — *Leptophoenix* Becc. in Ann. Jard. Bot. Buit. II (1885) 82, loco generis.

Semen albumine ruminato.

7. **Nengella calophylla** (K. Schum. et Lauterb.) Becc. in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 27 (excl. var. *montana* Becc. = *Nengella pleurocarpa* Burret et var. *rhopalocarpa* Becc. = *Nengella rhopalocarpa* [Becc.] Burret); — *Nenga (Gronophyllum) calophylla* K. Schum. et Lauterb. Fl. Deutsche Schutzgeb. Südsee (1901) 208.

Dem ersten Material von *Nenga calophylla* lagen keine Früchte bei. Beccari nahm auf Grund der von ihm beschriebenen Varietäten gleichförmiges Nährgewebe des Samens an wie bei diesen und stellte die Art daher zu seiner Gattung *Nengella*. Neues Material leg. Clemens trägt zum Teil auch Früchte und es zeigt sich nun, daß das Nährgewebe in Wirklichkeit ruminat ist, die Art also zu *Leptophoenix* gehört. Von den Varietäten mußte var. *montana* einen neuen Namen erhalten, da eine *Nengella montana* Becc. bereits existiert. Während bei *N. rhopalocarpa* die Fiedern in scharf geschiedenen Gruppen dicht genähert stehen, besonders die oberen stark verbreitert, im Umriß fast dreieckig sind und die obersten einen deutlichen Halbfächer bilden, sind die Fiedern von *N. pleurocarpa* (= var. *montana*) wenig verbreitert, nicht in scharf getrennten Gruppen angeordnet, auch bilden die obersten Fiedern keinen Halbfächer.

Von *Nengella calophylla* liegt jetzt folgendes Material vor:

Nordöstl. Neuguinea: Sattelberg, 970 m (Lauterbach n. 564). Sattelberg, 750 m (E. Nyman n. 707). Sattelberg, etwa 3000 Fuß (Clemens n. 135, 298, 696, 808, 1183). Wareo, etwa 2000 Fuß (Clemens n. 1484, 1623).

Von einer Unterscheidung von Formen wird abgesehen.

8. **Nengella pinangoides** (Becc.) Burret nov. comb. — *Nenga pinangoides* Becc. Malesia I (1877) 28. — *Leptophoenix pinangoides* Becc. in Ann. Jard. Bot. Buit. II (1885) 82.

Nordwestl. Neuguinea: Ramoi (Beccari n. 430, non vidi). Andai am Fuß des Arfak (Beccari n. 551, non vidi).

9. **Nengella minor** (Becc.) Burret nov. comb. — *Leptophoenix minor* Becc. in Webbia I (1905) 298.

Brit. Neuguinea: Mekeo-Distr., Fluß San Guisepe (Loria, non vidi).