

tenuissimi paulo conspicui, subtus in facie oculo fortissime armato paleae minutissimae cinnamomeae, breviter lanceolatae, numerosas conspicuae. Spadix parvus, i. s. albo-tomentosus, pilis minutissimis, densissimis, oculo armato haud conspicuis. Pedunculus ab ima basi 7 cm longus, spatharum annulis 1,5 cm vix dissitis, supra annulum superiorem 2 cm circ. altus, ibique bracteis paucis spiralibus, latissime ovatis, sterilibus praeditus. Rhachis 16,5 cm circ. longa, ramis circ. 30 vel paulo ultra. Rami cernui, longiores circ. 50 cm longi. Foveae spiraliter densiuscule dispositae, profundae. Fructus juvenes perianthio 4 mm fere alto. Sepala latissime ovata. Petala latissime rotundata, apice valvato obtuso subito imposito. Plantae juveniles foliis primordialibus digitato-flabellato-pinnatisectis.

Panama: Canal-Zone, Aqua Salud (13. Juli 1923 — O. F. Cook et R. D. Martin Nr. 59).

Die Art gehört zur Sektion II. *Euterpopsis*, wie aus den beigefügten Keimflanzen mit gefiederten Erstlingsblättern zu schließen ist. Sie läßt sich am besten an *E. montis Duida* Burret und Verwandte\*), Nr. 25—28 meiner Aufzählung, anschließen. Die Fiedern hängen nicht vertikal herab, sondern sie stehen von der Rhachis ab. Der Filz des Kolbens ist sehr kurz, der Kolben außerordentlich zierlich, gegenüber *E. montis Duida* ist der auch sonst abweichende Filz durch die weiße Farbe verschieden.

**Onocarpus Dryanderæ** Burret nov. spec. — Palma 12 m circ. alta. Caudex, ut videtur, solitarius, (ex vagina) 10 cm circ. in diam. Vagina 55 cm circ. longa, inferne cylindrica, praeter margines crasse lignoso-coriacea, glabra vel glabrata, ad marginem superne laciniata et modice fibrosa, fibris plerumque haud solutis. Petiolus 65 cm longus, supra profunde canaliculatus, subtus rotundatus, decidue furfuraceo-leprosus, apice 2,5 cm latus. Laminae rhachis 95 cm longa, dorso decidue leprosa. Segmenta ad 2 vel plura valde approximata, a sequentibus spatiis longis vel conspicuis dissita, directionibus variis abeuntia, sed omnia leviter a rhachi patentia et modice cernua visu minus irregulariter pertensa, textura rigida, supra nitentia, subtus glauca, basi nonnihil plicata. Spatha superior 50 cm longa, fusiformis, apice cuspidata, aperta superne ad 9 cm lata, extus fusco-furfuracea, leviter, dense sulcata. Spadix 45 cm longus, fusco-furfuraceus, cernuus. Pedunculus 5 cm tantum omnino longus. Spatharum annuli 1 cm tantum dissiti. Rami numerosi, inter tenuiores, apice breviter undu-

---

\*) Vgl. Burret: Die Gattung *Euterpe* Gaertn. in Engl. Bot. Jahrb. LXIII (1929) 49—76, insbesondere S. 52.

lati, attenuati. Florum alveoli densi. Flores ♂ ambitu fere ovales, 4 mm longi, 3 mm fere lati. Calyx 1 cm altus, sepalis ovatis, carinatis, leviter acuminatis, usque 1,5 mm longis. Petala late oblonga, obtusiuscula. Antherae lineares, 2 mm longae.

Colombia: Westküste, Insel vor Buenaventura. Palme 12 m hoch. Blütenkolben rostbraun (Frau E. Dryander).

Die Art ist ausgezeichnet durch die in sehr deutlichen Gruppen angeordneten Fiedern, die kleinen Kolben und den anscheinend unverzweigten Wurzelstock. Auf einer beigefügten Photographie sieht man nur zwei ziemlich weit voneinander entfernte Stämme, die wahrscheinlich aus zwei Früchten hervorgegangen sind. Am besten schließt sie sich an *Oenocarpus multicaulis* Spruce an.

---