

nudo; floribus plus minus biseriatis, rachide apice plerumque nudo, bracteis sterilis, calyce circ. 2 mm. longo, spatella paullo superante, corolla recta vel recurvato-arcuata 6-7 mm. longa, petalis apice incrassatis, acutis circ. 1 mm. latis; staminibus 6-7, filamentis liberis circ. 1 mm. longis, antheris 2-4 mm. latis.

Sankuru, 1903-1904 (Ém. et M. Laurent).

Obs. — Cette espèce est affine du *R. Morteihani*, nous étudierons ultérieurement la différenciation de ces diverses espèces.

Raphia Gilleti (*De Wild. Beccari Studio monog. gen. Raphia in Webbia III (1910) p. 105, fig. 6, IV a, b.*

Entre Ubangi-Congo, 1912 (A. Sapin).

Obs. — Fruit atteignant 5.5 cm. de long et 3,5 cm. de large, écailles plus ou moins profondément sillonnées, atteignant 16 mm. de long et 15-16 mm. de large, mucron 5-6 mm. de long. Spadice atteignant 80 cm. de long et 40 cm. de large, à pédoncule atteignant 9 cm. de diam.

Raphia Laurentii *De Wild.; Beccari Studio monog. gen. Raphia in Webbia III (1910) p. 68, fig. 6, V a, b.*

Bamania, 1905 (M. Laurent, n. 909); Limbutu, 1906 M. Laurent, n. 957.

ONCOCALAMUS *Mann et Wendl.*

Oncocalamus Djudu *De Wild. nov. spec.*

Scandens usque 25 m. longus; foliis pennatis, rachide infra sparse spinoso, foliolis superioribus usque 24 mm. latis, margine sparse spinosis, nervo mediano infra prominente, nervis lateralibus utrinque circ. 10 paullo elevatis; ramis inflorescentiae circ. 28 cm. longis, floribus fasciculatis, fasciculis bracteatis, bractea cupulata unilateraliter fissa, floribus 9-11; 4+4 masculis anterioribus et 3 femineis vel 3+3 masculis anterioribus et 3 femineis posterioribus, cupulatis; floribus masculis...; femineis breviter pedicellatis, calyce 4-5 mm. longo profunde 3-lobato, lobis subacutis 3,5 mm. circ. latis, petalis carinatis circ. 4-4,5 mm. longis et 2,5 mm. circ. latis, apice cuneatis; fructibus aurantiacis, subglobulosis, apice rotundatis vel brevissime apiculatis, 13-15 mm. circ. longis, bracteis circ. 18-seriatis usque 4 mm. latis, supra longitudinaliter et leviter canaliculatis, semina unica subglobulosa, leviter compressa, laevi.

Au sud de la Maringa, 28 octobre 1913 (Nannan, n. 65. — Très fréquent dans les forêts marécageuses. — Nom ind. : Djodu).

Obs. — Plante caractérisée par des fascicules de 3 fleurs femelles postérieures et de 8 ou 6 fleurs mâles antérieures.

EREMOSPATA *Mann et Wendl.*

Eremospatha Laurenti *De Wild. nov. spec.*

Foliis pennatis, 1 m. 50 longis, basi vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula plus minus oblique abscissa, integra, circ. 2 cm longa, rachide basi circ. 2,5 cm. lato, pars inferiore supra leviter canaliculato, pars superiore supra plus minus carinato subacuto, infra basi carinato-subacuto, apice rotundato; cirrha...; rachide basi lateraliter plus minus dense spinoso, spinis plus minus recurvatis, patulo-erectis, usque 5 mm. longis; foliolis basilaribus plus minus reductis, linearilanceolatis usque 8 cm. longis et 3 mm. latis, spinis 5 mm. longis exceptis; foliolis medianis lanceolatis usque 47 cm. longis 4,2 cm. latis, margine plus minus dense ciliato-spinosis, spinis patulo-erectis, vel raro recurvatis, 4-5 mm. longis, nervis numerosis utrinque nervo mediani ultra 10, paullo prominentibus; inflorescentiis axillaribus, rachide ultra 40 cm. longo, ramoso, ramis circ. 36, basi circ. 2 mm. latis; 9-23 cm. longis; floribus geminatis, oppositis vel alternis, 2-6 mm. distantibus; calyce campanulato-cupulato, basi truncato, 3 mm. circ. longo, trilobato, lobis subrotundatis; corolla 7-8 mm. longa, obovoidea, 3-lobata, lobis circ. 3,5 mm. longis, staminibus 6, filamentis late connatis.

Entre Bolobo et Yumbi, 14 avril (M. Laurent, n. 645).

Obs. — Espèce voisine des *E. macrocarpa* et *E. Sapini*.

Eremospatha Sapini *De Wild. nov. spec.*

Foliis pennatis vaginantibus, vagina apice ligulata, ligula tubulosa 2-4 cm. longa, apice integra oblique abscissa, circa medium plerumque uni vel bi-transversaliter replicata, rachide basi 15-60 mm. lato, infra applanato-rotundato, supra carinato-obtusos, apice cirrhoso, cirrha ultra 1 m. longa, spinosa, spinis subulatis, erectis vel vulgo recurvatis, alternis vel oppositis, triquetris, usque 4 cm. longis, rachide basi et lateraliter plus minus dense spinoso, spinis recurvatis vel erectis, apice nigrescentibus usque 3,5 mm. circ. longis, apice paullo ar-