

spiraliter dispositi; foeminei in parte inferiore ramorum incrassata subdistichi. Fl. masc. gemini vel interdum solitarii; stamina 6; antheræ loculis fere omnino disjunctis, basi auriculato-sagittatis, filamento brevi, in connectivum brevissimum, furcatum, apice continuato; rudimentum ovarii subnullum. Drupæ rubræ, angustissimæ, subcolumnares, cylindraceæ, basi incrassatæ, apice truncato tridentato-coronato (25 mill. long., 5-6 mill. latæ). Semen elongato-conicum acuminatum, albumine parce ruminato.

Abita. — Colline e montagne presso *Sarawak* in Borneo. (P. B. n.º 1089, 1524, 3083).

Osservazioni. — È forse la più elegante delle specie di *Areca*; gli stami sono singolarissimi per le loggie quasi completamente disunite e solo connesse fra loro in un punto, un poco al disopra della base, dove il connettivo si biforca; le loggie sono acute, apiculate ed alla base semisagittate.

ARECA ARUNDINACEA *sp. n.* — Caudex erectus, simplex, gracilis, 2 m. altus., 9-13 mill. crassus. Frondes flabelliformes, lamina elongato-cuneiformi, 60 cent. longa, basi in petiolum brevissimum (10-15 mm.) attenuata, profunde furcato-fissa, segmentis 2, circiter 6 cent. latis, 10-12-nerviis, apice truncato, argute dentato. Spatha completa solitaria. Spadices simpliciter parum(6-7)-ramosi. Flores spiraliter dispositi; foeminei in parte inferiore ramorum incrassata insidentes. Fl. masc. gemini; calyx cupulatus acute tridentatus, tubo elongatulo; petala ovato-lanceolata, longitudinaliter profunde sulcato-costata; stamina 6; antheræ basifixæ erectæ, loculis parallelis inter se omnino conjunctis, filamento brevissimo; ovarii rudimentum conico-subulatum. Drupæ

Abita. — Borneo, Ragiato di Sarawak, nelle colline dell'interno presso il fiume *Sakarang* nel Settembre 1867. (P. B. n.º 3850).

Osservazioni. — Anche questa specie è distintissima e caratteristica per le frondi con i piccioli cortissimi.

ARECA FURCATA *sp. n.* — Caudex gracilis simplex (?) flexuosus (?) apice incrassatus (semper?), 8-10 mill. diam. Frondes flabelliformes, lamina petiolo subtriplo longior, profunde bipartito-furcata, segmentis 8-10 nerviis, 2-5 cent. latis, 25 cent. lon., apici rotundato-truncatis, argute serrato-dentatis. Spatha completa solitaria. Spadix simpliciter parum(5)-ramosus. Flores spiraliter dispositi; foeminei in parte inferiore ramorum incrassata, sessiles. Fl. masc. globoso-trigoni gemini; calyx cupularis superficialiter trilobus; stamina 12; antheræ loculis omnino inter se discretis, basi rotundatis, exauriculatis nec sagittato-productis, filamento brevi furcato, cruribus elongatulis. Drupæ

Abita. — Colline del *Bellaga* nell'interno di Borneo nel paese dei *Kajan* (Ragiato di Sarawak) Settembre 1867. (P. B. n.º 3787).

Osservazioni. — Specie distintissima, affine all' *A. tenella*, ma da essa distinguibile anche a prima vista per le foglie intere e non fesse.

Per molti caratteri queste 3 specie si ravvicinano assai all' *A. paniculata* Scheff. e potrebbero rientrare nel sottogenere *Mischophylæus*. È singolare che mentre tutte