

2-lappig, keinesfalls acuminat, sie sind auch viel schmärer und kürzer, die fünfte Fieder von oben mißt 35—36 × 1—2 cm. Die mittleren und unteren Fiedern sind allerdings oben schmal und fein zugespitzt. Im übrigen trifft die Beschreibung der Rhachis und der Fiedern zu.

Nach allem möchte ich trotz der Unstimmigkeiten, besonders wegen des benachbarten Standorts, *G. Hombronii* stammt von der nur wenig entfernten Insel St. Georges, und nicht zuletzt wegen der Angabe von Herrn Brass, daß es sich um eine in Mengen vorkommende Palme handelt, diese doch für identisch mit *Gulubia Hombronii* Becc. halten.

**Paragulubia** Burret nov. gen. — *Florum glomeruli decussati.* Flores ♂ . . . Flores ♀ sepalis rotundatis, late imbricatis, petalis late rotundatis, imbricatis. *Staminodia, ut videtur, 6, dentiformia.* *Gynaeceum stigmatibus brevissime triangularibus.* *Ovulum parietale, rraphe elongata.* *Semen hilo elongato, lineari, rrapheos ramis utrinsecus paucis.* *Albumen ruminatum.* *Palma alta, brachii humani circ. crassitudinis.* *Frondes pinnatisectae, segmentis praemorsis, nervo primario unico, in nervis secundariis solutis ideoque nervis marginalibus conspicue incrassatis.* *Spadix scopiformis, duplicato-ramosus.*

Die Gattung ist am besten zwischen *Gulubia* und *Adelonenga* unterzubringen. Von ersterer unterscheidet sie sich durch die praemorsen Fiedern und das ruminante Endosperm. Näher steht *Paragulubia* wohl *Adelonenga*, mit der sie in Frucht und Samen gut übereinstimmt. Es sind jedoch die Fiedern von *Paragulubia* von starken Längsnerven eingefast, sie trennen sich also in den Sekundärnerven, bei *Adelonenga* besitzen die Fiedern keinen Randnerv, sie trennen sich zwischen den Sekundärnerven.

**Paragulubia macrospadix** Burret nov. spec. — *Palma usque 20 m alta, caudice superne sensim attenuato, nudo, annulis regulariter sequentibus, sat remotis.* *Frondis vagina cylindrica, 90 cm longa, firma, sed inter minus robustas, extus i. s. dense nervoso-striata, glabra vel glabrata, apice valde oblique obtusa, in petiolum transiens.* *Petiolus 50 cm longus, supra inferne valde excavatus, marginibus acutis, subtus rotundatus.* *Lamina 1,95 m longa, arcuata atque superne nonnihil recurvata, segmentis a rhachi surgentibus, superne modice cernuis.* *Segmenta regulariter disposita, rigida, supra nitentia, subtus pallidiora, opaca, infima quam sequentia nonnihil angustiora, prob. mediae circ. rhacheos visa 1 m circ. longa, omnia apicibus destructis, ad imam basin leviter curvata, nonnihil reduplicata, ceterum recta, dimidiam versus ad 3,5 cm lata, superne sensim, conspicue angustata, costa media supra valde, subtus paulo promi-*