

10. **Paralinospadix Schlechterii** (Becc.) Burret nov. comb. — *Linospadix Schlechterii* Becc. in *Webbia* I (1905) 296.  
Deutsch Neuguinea.
11. **Paralinospadix geomiformis** (Becc.) Burret nov. comb. — *Linospadix geomiformis* Becc. in *Lorentz Nova Guinea* VIII (1909) 213, tab. 51, 1.  
Niederl. Neuguinea.
12. **Paralinospadix caudiculatus** (Becc.) Burret nov. comb. — *Linospadix caudiculata* Becc. in *Lorentz Nova Guinea* VIII (1909) 213.  
Niederl. Neuguinea.
13. **Paralinospadix microspadix** (Becc.) Burret nov. comb. — *Linospadix microspadix* Becc. in *Engl. Bot. Jahrb.* LII (1914) 34.  
Deutsch Neuguinea.
14. **Paralinospadix pauciflorus** (Ridl.) Burret nov. comb. — *Linospadix pauciflorus* Ridl. in *Transact. Linn. Soc. Bot.* IX (1916) 233.  
Brit. Neuguinea.
15. **Paralinospadix pachystachys** Burret nov. comb. — *Linospadix pachystachys* Burret in *Notizbl. Bot. Gart. und Mus. Berlin* XI (1933) 711.  
Waigeu.
16. **Paralinospadix leptostachys** Burret nov. comb. — *Linospadix leptostachys* Burret l. c. 711.  
Niederl. Neuguinea.
17. **Paralinospadix amischus** Burret nov. spec. — Frondis vagina 18 cm longa, fusco-leprosa, cylindrica, ad apicem in fibras plurimas tenues dissoluta. Petiolus nullus. Lamina 60 cm fere longa. Rhachis 43 cm longa, subtus fusco-leprosa. Lamina ambitu circ. elongato-elliptica, multifida, nervis primariis 23 utrinsecus percursa, segmentis utrinsecus circ. 12, inferioribus nonnihil brevioribus, inferioribus 7 praeter infima ambo binervia nervo primario unico percursis, superiora praeter uninervium utrinsecus interjectum pluri-nervia, apicalia latissima, nervis primariis 7 percursa. Segmenta omnia conspicue falcata, sat rigida, i. s. subtus pallidiora, in nervis secundariis fusco-leprosa. Spadix in axilla frondis, simplex, tenuis, 1 m fere longus. Spathae ambo ad basin pedunculi orientes, interior exteriorem modice superans. Pedunculus supra spathas nudus longus, fusco-leprosus. Spica circ. 20—25 cm longa, tenuis, quam pedunculus paulo crassior, fusco-leprosa. Flores in triadibus, ♀ inter-

medio, spiraleriter scrobiculati, axis margine late, nonnihil producto, truncato. Flores parvi, ♂ 2,5—3 mm fere longi, ambitu ovaies. Sepala late ovata, margine ciliata. Petala longitudinaliter striata. Stamina 9. Antherae lineares, basi breviter sagittatae, supra dimidium dorsum affixae. Pistillodium simplex, tenuiter columnare. Flores ♀: Sepala late rotundata. Petala apice breviter triangulari-valvato. Fructus non visi.

Brit. Neuguinea: Dieni, Ononge Road, Central Division, 500 m. Regenwald. Häufig, wenig mehr als 1 m hoch, Blätter etwa 10, Frucht rot, fleischig,  $\pm$  1,1 cm  $\times$  0,9 cm (April—Mai 1933 — L. J. Brass n. 3826).

Von den bisher bekannten Arten kommen nach der Beschreibung nur *P. arfakianus* (Becc.) und vor allem *P. Julianetti* (Becc.) in Frage. Von diesen scheint mir erstere nach dem Passus „Foglie con la fronde lunga circ. 50 cent. alla base assai lungamente denudata“ verschieden, da bei *Paralinospadix amischus* die untersten Fiedern ohne jeden Zwischenraum an die Blattscheide anschließen.

Mit *P. Julianetti* (Becc.) scheint mir die Art deshalb nicht identisch, weil der Passus der Beschreibung „segmentis conspicue falcato-sigmoideis . . . remotiusculis“ kaum zutrifft; als deutlich sigmoid-sichelförmig kann man jedenfalls die Fiedern dieser Art nicht bezeichnen, auch fehlt hier jede Spur von einem Blattstiel. Immerhin stimmt die Beschreibung sonst sehr weitgehend überein. Es ist bedauerlich, daß mir kein Material vorliegt.

Zu *Paralinospadix* gehört auch *Linospadix Leopoldi* Hort. Sander ex Gard. Chron. (1903) I, Suppl. Apr. 25, t. 106.

Nach der Abbildung — es fehlt jede Beschreibung — dürfte die Art kaum mit Sicherheit zu identifizieren sein, da es mehrere Arten mit solchen Wedeln gibt. Zu vergleichen ist z. B. *P. geonomiformis*.

**Gulubia Brassii** Burret nov. spec. — „Palma circ. 24 m alta, caudice pallide griseo, obscure annulato, 25 cm in diam. metiente. Frondes numerosae, rigidae, arcuatae, circ. 3,5 m longae (excl. vagina). Vagina circ. 1,5 m longa, tubulosa, extus glauca“, apex visus extus molliter densissime flavido-floccoso-tomentosus, sat breviter in petiolum productus, deltoideus, ibidem ad marginem plus minus lanuginosus. Petiolus brevis, supra vaginam 20 cm, supra vaginae partem productam deltoideam 10 cm tantum longus, dorso dense fusco-leprosus, late, modice convexus, supra concavus. Segmenta infima angustissima, sat brevia. Rhacheos fragmentum prob. supra dimidiam partem sectum triangulare, lateribus excavatis, dense furfuraceis, subtus convexum, decidue fusco-leprosum, segmentis