

Osservazioni. — Il tronco nudo di una pianta di questa specie che abbattei, senza comprendervi il ciuffo delle foglie, era alto 31 metri e di un palmo di diametro. Miquel nel « *Prodromus Floræ sumatranæ* » p. 591, dice che questa specie è stata ritrovata dal signor Teysmann sulla costa orientale di Sumatra a *Palembang* e sulla costa occidentale nel distretto di *Padang* non molto distante dal fiume *Anei*. Io dubito però che la pianta di Sumatra differisca da quella di Selebes e delle Molucche e che sia identica a quella che io ho trovato in Borneo e che mi sembra poter considerare come una specie distinta. Ecco di quest' ultima i caratteri differenziali; riserbandomi ad illustrare completamente queste 2 specie nel lavoro che mi propongo di pubblicare sulle Palme borneensi.

PHOLIDOCARPUS MAJADUM *sp. n.* — *Ph. IHUR* *Miq.* (non Blume) *Prodr. Fl. Sum.* p. 254, 591. (quod pl. Sum.)? — A *Ph. Ihur* *Bl.* differt fructibus pericarpio profundius scrobiculato, spadicibus gracilioribus, foliis fere usque ad rachidem flabellato-partitis, aculeis crebrerrimis reclinatis.

Abita. — Presso *Kutcin* a Sarawak in Borneo (P. B. n.° 2096).

Osservazioni. — Essendo questa una specie sostituyente il *Ph. Ihur* delle Molucche nella parte dell' Arcipelago malese abitata dagli Orán-után, o come son chiamati dai Malesi, *Maias*, ho voluto col nome specifico rammentare questo carattere geografico.

Il *Boraxus flabelliformis* L. che si vede qualche volta nelle Molucche non l' ho mai incontrato, nemmeno coltivato, nelle isole Papuane.

Tribus III. CORYPHINEÆ Mart.

Genus XII. LICUALA Rumph.

31. **LICUALA INSIGNIS** *sp. n.* — Caudex 3-4 metr. altus brachii humani crassitiæ, crebre cicatricoso-semiannulatus. Petioli 1^m30 cent. longi, graciles, basi remote spinuloso-subserrati, ceterum inermes, spinis gracilibus patentibus vel recurvulis; lamina in segmentis 13, liberis, usque ad basin partita (saltem in specimine asserto); segmenta elongato-cuneiformia, extima angustiora et breviora, (45 cent. long., 2 1/2-3 cent. lata) oblique truncata vix profundius quam reliquas duplicato-dentata, dentibus triangularibus, acutiusculis; segmenta intermedia latiora (60 cent. longa, apice 9-12 cent. lata); segmentum medianum circ. 25 cent. latum, obtuse duplicato-dentatum, dentibus latissimis. Spathellæ plurimæ, laxe vaginantes, profunde partito-hiantes, lamina expansa ovato-lanceolata, longitudinaliter nervosa nec carinata. Spadix elongatus, ramosissimus, ramis crassis (5-9 mill.) secundis, in racemos 5-10 diffusos sursum decrescentes crassiusculos 8-16 cent. long. partitis, furfure fusco tenuissimo adpersis. Flores majusculi 8 mill. long., in racemis spiraliter dispositi, pedicellati; pedicelli inferiores 2-3 mill. longi, bi-raro triflori; superiores, pedicello breviora, uniflori; calyx obconico-campanulatus 4-4 1/2 mill. long., 3 1/2 mill. latus