

Osservazioni. — Il frutto rammenterebbe moltissimo quello della *Cladosperma paradoxa*, ma il seme è molto evidentemente ruminato. Nell'insieme è specie molto polimorfa, forse in causa delle varie stazioni dove cresce; ma le differenze si riscontrano quasi solo nelle dimensioni delle parti, perchè del resto, l'abito è molto uniforme e caratteristico. Si possono distinguere le tre seguenti forme.

PINANGA CANINA forma MAJOR.

Abita. — A *Kutciñg* in Sarawak (P. B. n.º 2713).

Descrizione. — Stipite alto da 2-3 metri e 2 cent. di diametro. Internodi 8-9 cent. lunghi. Fronde 1 m. 70 lunghe, della quale misura 32-33 cent. sono occupati dalla guaina e circa 60 dal picciolo; questo è 6 mill. crasso. Segmenti pochi, fra tutto 12-14, compresi i terminali, 20-30 cent. lunghi, 5-10 cent. larghi nella parte mediana, con 4-8 nervi primari superiori. Si trova anche qualche segmento aberrante (specialmente nella prima coppia in basso), strettissimo ed uninerve. Spadici 25 cent. lunghi, con cinque rami. Forma lussureggiante, ma senza alcun dubbio conspecifica colle due seguenti. I frutti sono appena un poco più grandi della forma *intermedia*.

PINANGA CANINA forma INTERMEDIA.

Abita. — Sul *Monte Mattañg* presso *Kutciñg* in Sarawak (P. B. n.º 2920).

Descrizione. — Stipite alto circa 1 m. 50, del diametro di 1 cent., con internodi 3 $\frac{1}{2}$ -4 cent. lunghi. Fronde lunghe nell'assieme 65-80 cent.; in questa misura 14-17 cent. ne occupa la guaina, e 17-20 il picciolo, che è circa 4 mill. crasso. Segmenti circa 14, compresi i 2 terminali; questi sono simili a quelli della forma *major*, ma relativamente più corti e più lunghi; nel mezzo sono larghi 3-5 cent. e lunghi 10-15 cent., 3-5-nervi; quelli della prima coppia sono d'ordinario più stretti e spesso 1-2-nervi. Spadici 7-8 cent. lunghi; in 2 esemplari sono con 3 rami. Frutti identici a quelli della forma *major* od appena più piccoli.

PINANGA CANINA forma MINOR.

Abita. — Sul *Monte Mattañg* presso *Kutciñg* in Sarawak (P. B. n.º 1585).

Descrizione. — Stipite gracilissimo alto da 1 m. ad 1 m. 50 cent., del diametro di 4-7 mill.; ad internodi 1 $\frac{1}{2}$ -2 cent. lunghi. Fronde lunghe 37-47 cent.; di cui 9-10 cent. ne misura la guaina, e soli 4-8 il picciolo; i segmenti sono 14-21, della forma delle altre varietà, ma d'ordinario più stretti e molto frequentemente con 2 soli nervi primari superiori. Spadici 5-9 cent. lunghi, con 2-3 rami. Frutti mancano.

25. **PINANGA (SYLVESTRIS) JAVANA** *Bl. in Bullett. Néerland. 1838, p. 65 et: Rumphia II, p. 85, tab. 87 et tab. 110, fig. 2. — Miq. Pl. Jungh. p. 156. — Kunth, Enum. pl. III, p. 641. — Scheff. in Natuurk. Tijdsch. Ned. Ind. XXXII, p. 175 et in Ann. Jard. bot. Buit. I, p. 148, tab. 13 et 14. — H. Wendl. in Kerch. Palm. p. 253. —*