

Die Art ist ausgezeichnet durch die stark vorwärts gerichteten, langen, relativ wenig gebogenen Fiedern. Die Spathae des einfachen kleinen, aber ziemlich robusten Kolbens sind nicht dünn. Blütengruppen und Früchte folgen im weitem Abstand. Die jungen Früchte sind lang gestreckt, grade.

*P. porrecta* schließt sich an *P. sessilifolia* Furt. an, mit der sie den fast fehlenden Petiolus gemeinsam hat. Die vorliegenden jungen Früchte, die bei einer Breite von nur 4 mm 1,5 cm lang sind, überragen schon die von *P. sessilifolia*. Das Stämmchen von *P. sessilifolia* ist erheblich stärker. Die untersten Fiedern scheinen stärker gekrümmt. Von dem Kolben heißt es „simplex, 17—20 cm longus, 0,4 cm crassus, undulatus“, während der von *P. porrecta* kaum merklich hin und hergebogen, fast gerade ist. Leider ist die Beschreibung von *P. sessilifolia* sehr kurz.

*Pinanga neglecta* Burret nov. spec. — Caudex solitarius, robustus, 3 cm diam. Frondes magnae. Petiolus circ. 30 cm longus, validus, demum fusco-lepidotus. Lamina circ. 2 m longa, segmentis utrinsecus circ. 30, regulariter dispositis. Segmenta basilaria nonnihil minora, angustissima, maxima visa circ. media ad 60 cm fere longa, ad 3,3 cm, rarissime 3,6 cm lata, levissime sigmoidea, ad basin paululo curvata, ad apicem conspicue falcata, ceterum fere linearia, apice longe acuminata, segmenta majora fere omnia nervis primariis 2 percursa, apicalia tantum plurinervia, quam sequentia latiora, apice sat longe anguste dentata. Spadix 35—40 cm longus, recurvatus, ramis 3, longis. Pedunculus brevis, 1,5—2 cm circ. longus, valde applanatus. Rhachis 1 cm vix longa. Rami cernui sed non flexuosi, circ. 30—37 cm longi, sat tenues, apice longe fere filiformiter producti, fructus immaturos gerentes i. s. in dimidia circ. parte ad fructuum insertiones 3 mm, in internodiis 2 mm diam. Fructus conspicue immersi, in spira laxiuscula et parastichis 3 vel in dimidio ramo saepe fructus 3 fere in eadem altitudine in verticillis alternantibus et orthostichis 6 dispositi, immaturi tantum visi circ. cylindrici, 1 cm longi, apice leviter rostrati, stigmatibus triangularibus. Perianthium fere explanatum, 6 mm diam., vix superne curvatum. Sepala ovata, tegentia. Petala conspicue majora, late rotundata, apiculo parvo triangulari vel sat obscuro.

Java: Reservat Depok, 20 Minuten Bahnfahrt von Buitenzorg, robuste Palme mit kräftigem, einzelstem Stamm und vielen schmalen Fiedern. Kolben mit drei langen, dünnen Ästen, zusammen mit *P. Kuhlii* wachsend (4. März 1939 — M. Burret n. 330).

Die Art gehört zur Gruppe der *Spirantheae* Becc., sie ist mit keiner der von Beccari in seiner Bearbeitung der Gattung in

Malesia III (1886) 110 ff. aufgeführten Arten identisch, ebensowenig mit einer der Arten in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1892) 406/8 oder in Ridley Fl. Malay Penins. Von *P. densifolia* Ridl. unterscheidet sie sich schon durch den einzelnen, kräftigen Stamm, die großen Wedel und den großen Kolben mit drei langen Ästen. Auch von *P. glaucescens* Ridl. liegt mir kein Material vor, nach der Beschreibung kommt sie jedoch ebenfalls nicht in Frage. Auch die neuerdings beschriebenen Arten sind sicher verschieden.

*P. neglecta* erinnert im Habitus an *P. Kuhlii*, mit der sie leicht zu verwechseln ist. Sie unterscheidet sich jedoch bei genauerem Zusehen sofort durch die Anordnung der Früchte und Blütengruppen, die bei *P. Kuhlii* stets zwei gegenüberliegende Reihen bilden, auch hat *P. Kuhlii* zahlreiche Kolbenäste, ihre Fiedern sind meist breiter, von mehr Primärnerven durchzogen und weniger zahlreich.

Vergleiche auch die Bemerkungen S. 176.

*Pinanga macrospadix* Burret nov. spec. — Palma pro rata valde robusta, alta, caudice 3,5 cm et ultra diam. Frons magna, segmentis utrinsecus 20, plurinerviis, collecta pars suprema 1 m vix longa, textura robusta, utrinque, ut videtur, concolor, nervis primariis certe numerosis. Rhachis subtus nitens. Segmenta apicalia nervis primariis circ. 8 utrinsecus percursa, angulum acutum includentia, recta, haud curvata, in marginibus superioribus 33 cm longa, apice truncata, dentibus, ut videtur, haud longe linearibus, breviter bifidis, segmenta fragmenti visi 3 unius lateris regulariter sequentia, haud longe dissita, angulo 45° porrecta, recta vel apice tantum levisime curvata, infimum visum in margine superiore 76 cm longum, ad basin in nervis primariis et secundariis nonnihil plicatum, lineare. basin versus vix attenuatum, 5 cm in dimidia circ. diam., nervis secundariis subtus inferne paleis badiis linearibus. utrinque attenuatis, in dimidia affixis. inter nervos primarios et secundarios nervis tenuibus longitudinalibus densis i. s. utrinque bene conspicuis. Spadix magnus, in pedunculo supra spadice annulum modice retroflexus. Pedunculus 3—4 cm longus, applanatus, apice 12 mm latus. Rhachis 4,5—5,5 cm longa. Rami 9, longissimi, ad apicem cernui, distiche fere inserti, 35—40 cm vel paulo ultra longi, ad fructuum insertiones haud flexuosi, vix compressi, internodiis fere teretibus vel rotundato-subquadratis, infra dimidium ramum 5 mm circ. i. s. diam., superne sensim attenuati, ad apicem sat tenues, leviter flexuosi. Fructus distichi. utrius seriei numerosissimi, dimidii rami sequentes inter partes aequales 7 mm dissiti, axi infra fructus basin vix producta. Fructus inter majores, late elliptici vel obovato-elliptici, utrinque late rotundati. stigmatum cono minutissimo, vix conspicuo, i. s.