

Becc., die denen von *P. uncinata* ähnlich gestaltete aber zahlreichere und kleinere Fiedern besitzt.

*Pinanga porrecta* Burret nov. spec. — Palma parva, gracilis, caespitosa, caudicibus pluribus, tenuibus. Caudex 11 mm diam., internodiis 5,5 cm longis, fusco-lepidoto-punctulatus, punctulis minutis orbiculatis vel elongatis. Petiolus fere nullus, vagina fusco-furfuracea. Lamina 48,5 cm longa, 30 cm lata, ambitu circ. obovato-elliptica, basi fere obtusa, inter robustiores, i. s. subtus pallidior, minutissime dense fusco-punctulata, nervis primariis utrinsecus 18—19, late 3-juga. Segmenta inter majora, nonnihil porrecta, bene, 2,5—4 cm, inter se dissita, e basi lata linearia vel vix conspicue dilatata, superne leviter falcata, praeter apicalia ambo acuminata, segmenta infima ambo nervis primariis 5—6 percursa, in margine superiore 30 cm longa, in tertia inferiore usque 4 cm lata, jugi medii primariis 5, in margine superiore circ. 32 cm longa, in dimidia usque 5,3 cm diam., apicalia angulum sat acutum includentia, nervis primariis 8—9, margine superiore 20,5 cm longo, 6,2—6,5 cm diam., late fere linearia, apice truncata, dentibus breviter duplicato-ovatis. Spadix simplex, florifer jam ima basi infra spathae inferioris annulum 5 mm supra imam basin refractus, 9,5 cm longus, inter minus tenues. Spathae 14 cm longae, lineares, 2 cm latae, superne paulo attenuatae, in apicem ancipitem rotundatum vel acutiusculum exeuntes, minute lepidotae, densissime nervosae. Pedunculus brevissimus, fere nullus. Infra spicam bractea conspicue producto-triangularis, acuminata, 7 mm circ. longa inserta. Florum glomeruli distichi, laxissime sequentes, utrinsecus 6—7, dimidiae spicae inter partes aequales 12 mm dissiti. Rhachis dense albido-hirsuto-furfuracea, sat robusta, fere recta, infra florem ♀ late, longe producta, nonnihil acuminata, flori accumbens. Flores ♂ quam femineus multo majores, usque 4,5 mm tenuiter stipitati, 1 cm fere longi, ambitu ovato-oblongi, ± oblique acuminati. Sepala, ut videtur, obscura, minute triangularia. Petala jam descripta. Stamina plerumque ± destructa, ut videtur 9, filamentum perbreve, paulo supra basin inserto, anthera angustissime lineari, 5 mm et ultra longa, apice subapiculata. Fructus juveniles fere cylindrici, anguste lineares, superne paulo attenuati, 1,5 cm longi, inferne 4 mm lati, cono stigmatifero sat longo, ad basin conspicue dilatato. Perianthium cupuliforme, 4,5 mm altum, calyce corollae aequalto. Sepala libera, tegentia, ovata, petala, ut videtur, ejusdem formae.

Sumatra: Bei Lebong Tandai nördlich Benkulen. Wald. Kleine Palme mit mehreren dünnen Stämmchen und fast fehlendem Blattstiel (16. Mai 1939 — M. Burret).

Die Art ist ausgezeichnet durch die stark vorwärts gerichteten, langen, relativ wenig gebogenen Fiedern. Die Spathae des einfachen kleinen, aber ziemlich robusten Kolbens sind nicht dünn. Blütengruppen und Früchte folgen im weitem Abstand. Die jungen Früchte sind lang gestreckt, grade.

*P. porrecta* schließt sich an *P. sessilifolia* Furt. an, mit der sie den fast fehlenden Petiolus gemeinsam hat. Die vorliegenden jungen Früchte, die bei einer Breite von nur 4 mm 1,5 cm lang sind, überragen schon die von *P. sessilifolia*. Das Stämmchen von *P. sessilifolia* ist erheblich stärker. Die untersten Fiedern scheinen stärker gekrümmt. Von dem Kolben heißt es „simplex, 17—20 cm longus, 0,4 cm crassus, undulatus“, während der von *P. porrecta* kaum merklich hin und hergebogen, fast gerade ist. Leider ist die Beschreibung von *P. sessilifolia* sehr kurz.

*Pinanga neglecta* Burret nov. spec. — Caudex solitarius, robustus, 3 cm diam. Frondes magnae. Petiolus circ. 30 cm longus, validus, demum fusco-lepidotus. Lamina circ. 2 m longa, segmentis utrinsecus circ. 30, regulariter dispositis. Segmenta basilaria nonnihil minora, angustissima, maxima visa circ. media ad 60 cm fere longa, ad 3,3 cm, rarissime 3,6 cm lata, levissime sigmoidea, ad basin paululo curvata, ad apicem conspicue falcata, ceterum fere linearia, apice longe acuminata, segmenta majora fere omnia nervis primariis 2 percurta, apicalia tantum plurinervia, quam sequentia latiora, apice sat longe anguste dentata. Spadix 35—40 cm longus, recurvatus, ramis 3, longis. Pedunculus brevis, 1,5—2 cm circ. longus, valde applanatus. Rhachis 1 cm vix longa. Rami cernui sed non flexuosi, circ. 30—37 cm longi, sat tenues, apice longe fere filiformiter producti, fructus immaturos gerentes i. s. in dimidia circ. parte ad fructuum insertiones 3 mm, in internodiis 2 mm diam. Fructus conspicue immersi, in spira laxiuscula et parastichis 3 vel in dimidio ramo saepe fructus 3 fere in eadem altitudine in verticillis alternantibus et orthostichis 6 dispositi, immaturi tantum visi circ. cylindrici, 1 cm longi, apice leviter rostrati, stigmatibus triangularibus. Perianthium fere explanatum, 6 mm diam., vix superne curvatum. Sepala ovata, tegentia. Petala conspicue majora, late rotundata, apiculo parvo triangulari vel sat obscuro.

Java: Reservat Depok, 20 Minuten Bahnfahrt von Buitenzorg, robuste Palme mit kräftigem, einzelstem Stamm und vielen schmalen Fiedern. Kolben mit drei langen, dünnen Ästen, zusammen mit *P. Kuhlii* wachsend (4. März 1939 — M. Burret n. 330).

Die Art gehört zur Gruppe der *Spirantheae* Becc., sie ist mit keiner der von Beccari in seiner Bearbeitung der Gattung in