

Plectoconica Pierreana Becc. sp. n.

Inter minores; frondium supremarum segmentis inaequidistantibus, lineari-lanceolatis, utrinque virentibus, subtus vix pallidioribus; fructibus sphaericis, abrupte rostratis, circ. 2 cm. diam.; squamis per 42-44 orthostichas ordinatis, squarrosis, apice valde producto acuto, ciliato, recto, minime recurvo; semine globoso, nonnihil depresso, 14-15 mm. lato, 11-11.5 m. alto; perianthio fructifero explanato, sepalis delthoideis acutis, corollae segmentis lanceolatis, acuminatis, calyce subtriplo longioribus; antheris sterilibus sagittatis.

HABITAT. — Nel Camboge sui monti Cam-chây nella Provincia di Kampuh, all'altezza di 900 m. sul livello del mare (Pierre nell'Erb. di Parigi). Un altro esemplare, apparentemente della medesima provenienza, si trova nell'Erb. del « British Museum » e faceva parte dell'Erbario di Hance (n.° 19241).

OSSERVAZIONI. — È una delle più piccole specie, delle dimensioni della *Plectocomia Muellerii*, alla quale rassomiglia anche per i frutti; ma quelli della *P. Pierreana* hanno le squame che si terminano in una punta dritta e non come nella *P. Muellerii* ripiegata in dietro; inoltre la punta non si prolunga in lunghe setole. Si distingue dalla *P. Muellerii* anche per i segmenti delle fronde superiori più stretti e per le antere degli stami sterili nel fiore femineo sagittate, mentre sono lineari nella *P. Muellerii*.