

specifico è scritto: *Jeanneceyi*), e che è una vera *Licuala*, rappresenta una specie distinta proveniente veramente dalla Nuova Caledonia, o se è piuttosto la grandemente diffusa *Licuala Muellerii*.

PRITCHARDIA Seem. et H. Wendl.

Pritchardia minor Becc., sp. n.

Caudice circ. 5 m. longo, laevi, 15 cm. diam., foliorum petiolo brevi, circiter 30 cm. longo, lamina parva, suborbiculari, latiori quam longiori, 45 cm. lata; spadice circ. 30 cm. longo; floribus parvis, calyce campanulato, 3-3.5 mm. longo; urceoli staminalis dentibus (staminum filamentis) brevissimis et etiam sub fructu erectis; fructibus elliptico-ovatis vel subobovatis, basi plus-minusve conspicue attenuatis, minute et saepius oblique apiculatis, 18-20 mm. longis, 12-13 mm. crassis.

HABITAT. -- I frutti di questa piccola specie di *Pritchardia* mi sono stati inviati in maggio 1909 dal D. Franceschi di California; essi provenivano dall'Isola di Kauai, la più settentrionale del gruppo delle Hawaii, crescendo ad una altezza di poco più di 4000 piedi sull'altipiano di Waimea.

A questa stessa specie mi sembra si debbano riportare i fiori di una *Pritchardia* raccolta nelle Hawaii da Hillebrand e dei quali è fatta menzione nella « Malesia », v. III, p. 294, e che sono ivi contraddistinti con la lettera (A).

CYPHOSPERMA Wendl.

Cyphosperma ? Tete Becc. sp. n. (Fig. 2).

Caudice gracili, subelato, 6-7 cm. diam. Frondium segmenta intermedia subsigmoideo-lanceolata, apice oblique