

**Var. gracilior** Burret nov. spec. — Caudex arundinaceus, 0,5 cm circ. in diam. metiens, internodiis 2—3,5 cm longis. Frondes nanae. Vagina in latere petiolo opposito 5 cm longa, tubulosa, i. s. longitudinaliter dense costata, minute fusco-leproso-lepidota, subito in petiolum contracta. Petiolus tenuis, fusco-lepidotus, 6,5 cm longus, supra sulcatus. Rhachis praecipue subtus inferne minute fusco-lepidota, superne linea latiuscula albida, glabra, notata, dextra sinistra lepidota. Lamina 3-juga vel 4-juga, 28 cm longa, nervis primariis 18 utrinsecus percursa. Jugum apicale quam sequentia latius vel brevius, nervis pluribus percursum, segmenta visa rhomboidea, 4,5—5 cm lata, marginibus leviter curvatis, superiore 9 cm longo, jugi sequentis segmenta lanceolata, infimi ovato-lanceolata, falcata, acuminata. Segmenta sat tenuia, supra i. s. atroviridia, glabra, subtus albida, dense minute lepidota et plus minus decidue albido-pilosa. Spadix in fragmento densissime florifero 4 cm longo, cum floribus ♂ 9 mm in diam. metiente, superne modice angustato visus. Axis crassiuscula, dense pilosa, pilis albis, crispis. Florum glomeruli spiraleriter dense dispositi, in seriebus minus axin versus inclinatis 3, flore ♀ masculis binis dextra sinistra superpositis. Flores ♂ stipitati, stipite lato, applanato. Sepala et petala subaequilonga, 6—7 mm circ. longa, extus pilis albidis crispis instructa. Sepala anguste linearia, plus minus carinata, in apicem subulatum vel demum fere filiformem, saepe tortum exeuntia. Petala multo latiora, ovato-oblonga, acuminata et in apicem sepalorum similem producta. Stamina 9. Filamentum crassum, breve vel sat breve,  $\frac{1}{2}$  antheram vel ultra in longioribus aequans. Antherae fere ovato-oblongae, 2 mm longae, connectivo dorso superne dilatato introrsae, sat longe apiculatae, basi sagittatae. Pistillodium nullum. Flores ♀ nondum sub anthesi visi ovati, perianthium stigmatate superatum. Calyx cupularis, superne contractus, dentibus brevissime, latissime triangularibus. Petala libera, imbricata, late rotundata. Ovarium ovatum, stigmatate breviter penicillato superatum. Staminodia nulla. Ovulum basilare.

Britisch-Nordborneo: Mount Kinabalu, Tenompok, 5000 Fuß. Männliche Blüten weiß. Frucht grün bis gelb und orange (26. März 1932 — J. et M. S. Clemens n. 29204).

2. **Pseudopinanga aristata** Burret nov. spec. — Caudex 1,5 cm in diam., internodiis visis 7—9 cm longis. Frondis pars superior 38 cm longa visa 2-juga. Rhacheos fragmentum 35 cm longum visum triangulare, subtus linea latiuscula longitudinali laevi, glabra notata, dextra sinistra ut supra minutissime fusco-lepidota, in parte

infima 5,5 cm longa nudum, dein jugum inferius visum exserens, segmentis sigmoideis, nervis primariis 4 percursis, 25 cm longis, linearilanceolatis, ad tertiam superiorem partem 5,5 cm latitudine paulo superantibus, utrinque paulo attenuatis, apice oblique dentato, margine superiore oblique nonnihil acuminato, valde inaequaliter bifido, dentibus reliquis 3 brevioribus, minus inaequaliter acute bifidis. Inter jugum descriptum atque apicale rhachis 7 cm longa nuda interjecta. Jugum apicale quam descriptum latius, brevius, segmenta nervis primariis 7—8 percursa, margine superiore 14,5, inferiore 17 cm longo, a basi 6,5 cm in diam. metiente leviter dilatata, superne 8 cm lata, dentibus superioribus subito contractis, sat brevibus, emarginatis, inferioribus acutiusculis, longioribus, bifidis. Segmenta sat patentia, rigidiuscula, i. s. supra atroviridia, glabra, subtus pallidiora, squamulis minutissimis, fuscis lepidota, e quibus sub lente forti trichomata tenuia, crispa, albida marginaliter exserta, densiuscula, sed plus minus decidua. Spadix . . . Flores ♂ stipite 1,5 mm fere longo, crasso, compresso pedicellati, aperti perianthio surgente, haud explanato, magnitudinis mediocris. Calyx ad basin connatus, lobis anguste linearibus, 1 mm circ. latis, superne in apicem parti inferiori lineari subaequilongum subulatum, filiformem vel fere aristatum, saepe superne plus minus tortum exeuntibus cum apice descripto omnino 0,5 cm circ. longis. Petala ut sepala inter tenuiora, valvata, ambitu ovato-lanceolata, excavata, apice brevius subulato vel filiformi, sine apice circ. 0,5 cm longa, extus pilis crispis albo-pilosa. Stamina 9, introrsa. Filamentum perbreve, crassum, applanatum. Anthera ima basi affixa, sagittata, subovato-oblonga, 1,5 mm longa, filamento in connectivum dorso dilatatum, supra thecas breviter apiculatum transeunte. Pistillodium nullum. Flores ♀ et fructus ignoti.

Britisch-Nordborneo: Mount Kinabalu, Dallas, 3000 Fuß (J. und M. S. Clemens n. 27259).

Von dieser Art fehlen weibliche Blüten; sie erinnert in den männlichen Blüten sehr an die vorhergehende.

3. **Pseudopinanga paucisecta** Burret nov. spec. — Caudex superne circ. 1,5 cm in diam. metiens, internodiis supremis 2,5 cm longis. Frondis vagina 9 cm longa, dein oblique truncata, in petiolum contracta, cylindrica, superne conspicue dilatata, extus nonnihil, sat dense costata, fusco-leprosa. Petiolus 13 cm longus, forsan ultra, inter tenuiores, fusco-leprosus. Lamina ambitu circ. elongato-obovata, 50 cm fere longa, basi cuneata, bijuga, tenuis, subtus furfuraceo-pilosa. Rhachis 37 cm longa. Segmenta basilaria ambo