

latis, apiculo cuneato-acuto, circ. 5 mm. longo et basi 3 mm. lato, fructibus, cum apiculo, circ 5 cm. longis et 16 mm. latis, squamis 12-seriatis, longitudinaliter leviter sulcatis 6-7 mm. latis et 10-11 mm longis.

Région de Kisantu (J. Gillet. — Nom ind. : Matombe).

*Obs.* — Cette espèce, dont nous ne connaissons ni les feuilles, ni l'inflorescence complète, se caractériserait par ses petits fruits.

Nous publierons, ultérieurement, une étude plus détaillée sur cette espèce et sur les autres palmiers nouveaux dont nous donnons ici une diagnose.

**Raphia Morteihani** *De Wild.* nov. spec.

Foliis pennatis; foliolis superioribus oppositis 2-2,5 cm. distantibus, 20-40 cm. longis et 16-25 mm. latis, nervo mediano infra prominente, apice cuneato-acutis, margine et nervo mediano sparse spinosis, spinis 2,5 mm. circ. longis; spadix..., inflorescentiis lateralibus circ. 25 cm. longis, rigidis, spatha inferiore usque 9 cm. longa, compressa utroque latere carinata, carina apice bicornuta, cornis, circ. 15 mm. longis, rachide appressa; bracteis unilateraliter breviter acutis; spicis biseriatis, usque 5,5 cm. longis, superioribus circ 2 cm. longis, rachide primari apice usque 7 cm. nudo; floribus masculis utroque latera uniseriatis, calyce circ. 3 mm. longo, breviter trilobato, lobis circ 1 mm. longis; corolla 6-7 mm longa plus minus falciformi, lobis circ. 1 mm. latis, apice incrassatis et acutis; staminibus 6-7 filamentis liberis circ. 1 mm. longis, antheris sagittatis, apiculatis, circ. 2-2,5. mm. longis.

Dundusana, octobre 1913 (Morteihan, n. 613. — Plante des marais à fruits comestibles. — Nom ind. : Makeke).

*Obs.* — Espèce voisine du *R. Laurenti* De Wild.

**Raphia sankuruensis** *De Wild.* nov. spec.

Spadix usque 50 cm. longus et 10-12 cm. latus, densus, basi spathaceus, spathae oblique abscissae, unilateraliter acutae usque 9 cm. longae; inflorescentiis lateralibus 15-17 cm. longis, rigidis, vagina inferiore utroque valde carinata et plus minus longe cornuta, cornis plus minus divergentibus circ. 2 cm. longis, bracteis unilateraliter acutis; spicis utroque latera biseriatis, usque 7 cm. longis, superioribus brevioribus circ. 2 cm. longis, rachide primari apice plerumque