

*in via quæ appellatur S. João. Fructus maturescunt martio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 230)

**15. B. setipinnata.** — Stipite humili, inermi; frondibus pectinatis; foliolis linearibus, falcatis, acuminatis, concinnis, 7-nervatis (nervuris ad inferiorem partem tenuiter ciliatis); spadice bipartito; drupa-subglobosa, coccinea, aculeata.

**Hab.** *ad fluvium Trombetas una cum B. Constanciæ Fructus maturescunt martio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 344)

**16. B. nemorosa.** — Stipite subcæspitoso, mediocri; rachide inermi; foliolis pectinatis, concinnis, oblique acuminato-cuspidatis; spadice tomentoso, tenuiter aculeato et quadripartito; spatha aculeis fuscis et brevibus hirta; fructibus oblongo-obovatis, corolla persistente aculeata.

**Hab.** *ad margines fluvii Capim ubi parvos cæspites in locis apertioribus silvarum efficit. Fructus maturescunt decembri.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 367)

**17. B. exaltata.** — Stipite [exaltato-flexuoso (5,<sup>m</sup>); rachide postice aculeata, antice inermi, foliolis oblique pectinatis, lineari-sublanceolatis, oblique et longe acuminatis; ciliatis; spatha paulo aculeata, acuminata; spadice quadripartito; floribus femineis, calyce intus annulato, corolla aculeata.

**Hab.** *ad margines fluvii Capim, in Provincia Paraensi et maritimo tracto urbis. Floret decembro.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 368)