

aculeata et fructibus, qui majores, quum maturescunt, et colore viridi neque rubro sunt.

Hab. in interioribus silvis inundatis in districtu Santarem, ubi nota est nomine marajá-açu da terra firme.

29. *B. granariuscarpa.* — Stipite cæspitose, erecto, mediocri, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 3-4-aggregatis, sub oppositis, lanceolatis, subfalcatis, oblique acuminatis. Flore femineo: calyce, corolla et ovario aculeatis, fructibus globoso-compressis, pseudo-muricatis.

Hab. in depressis locis camporum de Santarem, fluvio Ipanema proximis. Floret maio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 220)

30. *B. Constanciæ.* — Stipite mediocri, cæspitose, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis. Fructus sunt globoso-depressi, diametro 0^m,023, spinosi, viridi-rosei et postea violacei.

Hab. in silva lacum Achipicá circumdante ad fluvium Trombetas et ad rivum (igarapé) dos Remedios in fluvio. Rio Negro. Fructus maturescunt martio Aprili.

(Barb. Rod. hb. Palm. 342)

31. *B. interrupte-pinnata.* — Stipite inermi, brevissime annulata; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis lineari-lanceolatis; drupa globosa, coccinea, aculeata.

Hab. in silvis primævis ad lacum Curumú et cataractas fluvii Tarumá, in fluvio Negro. Fructus maturescunt maio. Indi muncupant Tayaçú-pupunha vel pupunha de porco.

(Barb. Rod. hb. Palm. 356)