

**Hab.** in superiore parte montis Curumu, plus ducentis pedibus super fluvium Trombetas. Fructus maturescunt aprili.

(Barb. Rod. hb. Palm. 358)

**10. B. sylvatica.** — Stipite mediocri, aculeato ; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 2-4-jugis ; spadice inermi, ramoso ; spatha inermi ; floribus femineis : calyce inermi, majore quam corolla aculeata, tridentata breviter ciliata ; ovario inermi.

**Hab.** in silvis ad margines fluvii Irurá in flumen Tapajós influentis. Floret junio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 221)

**11. B. xhantocarpa.** — Stipite humili, arundinaceo frondibus indiviso-falcatis ; spadice bipartito, raro simplici ; drupa globosa-turbinata, lutea.

**Hab.** in tractu ad cataractas fluvii Trombetas sito. Fructus maturescunt martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 340)

**12. B. inermis.** Trail. -- Palma inermi, mediocri arundinacea, 1<sup>m</sup> alta, diametro 0,<sup>m</sup>005 ; fronde pinnata, 8-9 foliolis binis primis erectis et extremis connexis, lineari-lanceolatis, falcatis, acuminatis ; spadice bipartito ; fructibus subglobosis, diametro 0,<sup>m</sup>005, rubris.

**Hab.** in silvis ad lacum Tapagem in fluvio Trombetas. Fructus maturescunt martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 348)

**VAR. tenuissimis.**

Est species quaedam, spadice bipartito carens, cu-

jugus fructus sunt turbinati et majores, foliola alterna, 0, m 15 longa et lata, longe acuminata, extrema angustiora et ad margines tenuissime ciliata.

**Hab.** *ad fluvium Jamundá.*

Pinnatifolia. § holacantha.

\*

(PINNATIFIDA)

**13.** *B. acanthocarpa.* var. *excapa*. — Palma acauli; spadice erecto, e solo emergente, aculeis nigris, erectis foliolis linearibus (0, m 02 latis), habitu sub-crispo.

**Hab.** *in silvis ad fluvium Capim et Parauacu confluentis amnis das Trombetas.* Vulgo appellatur marajá piranga. *Fructus maturescunt februario.*

(Barb. Rod. hb. Palm 234)

**14.** *B. linearifolia.* — Stipite humili, inermi, erecto cæspitoso. Frondes pectinatæ; petiolus invaginans, aculeatus (aculeis acicularibus, magnis et nigris); rachis filiforme prolongata ultra extrema foliola, quæ sunt linearia, acuminata, marginibus ciliatis; spadix sub-erectus 2-3-partitus; spatha interior ad verticem aculeata. Bacca subglobosa, rubra, inermis.

**Hab.** *in virgultis propre urbem Provincia Paraensis*