

**25.** *B. palustris*. — Stipite erecto, 4<sup>m</sup> alto, aculeato. Frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 2-7- jugis irregulariter, superne viridi-lucentibus, inferne albis; spadice pluriramoso; drupa globoso-turbinata, calyce et corolla minutissimis persistentibus.

**Hab.** *frequentissime ad margines lacus Curumú in rivis (igarapés) fluvii Parauacú, in fluvio Trombetas. Floret decembri et fructificat martio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 330).

**26.** *B. rivularis*. — Stipite erecto, 7<sup>m</sup> alto, flexuoso, elato, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolos 4-6- jugis, abrupte recurvis; spadice pluriramoso; spatha aculeata; drupa globosa, vertice umbonato, atro-violacea.

**Hab.** *ad margines lacus Curumú et fluvii Amazonum. Floret decembri et fructificat aprili.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 194).

**27.** *B. littoralis*. — Stipite altitudine 9<sup>m</sup>, diametro 0<sup>m</sup>,08, erecto, aculeato; frondibus 6-7 contemporaneis, pinnatis; petiolo juniore tomento albo vestito, aculeato; foliolis semi-erectis, 4-5- jugis, linearibus nervura media ad partem superiorem saliente et ad verticem aculeata; spadice curvo, ramoso, aculeato; spatha aculeata. Baccam non vidi.

**Hab.** *in ripas amnis Amazonum. Vulgo appellatur Marajá-açu da vargem.*

**28.** *B. marajá-açu*. — Hæc species similis est *B. littoralis*, tantum differt spatha, quæ est diversa, valde