

tis, ad paginam inferiorem velutinis. Flores et fructus nullos vidi.

Hab. *ad margines fluvii Jamundá.*

(Barb. Rod. hb, Palm. 362).

Pinnatifolia § exacantha.

6. B. oligocarpa. — *Barb. Rod. et Trail.* Deser. *Caudex* 3 pedalis, 2/5 pollicaris tenuis, sub-erectus, inermis, annulos conspicuis, haud vaginis ,aphyllis obvelatus, folia 11 aggregata secus apicem caudicis. *Folia* pinnata, bipedalia, pinnis 3-jugis; pinnae jugarum basalis et apicalis oppositae, pinnae mediæ duae (raro 3) alternae; pinnae basales venis primariis tribus, pinnae mediæ vena primaria unica, pinnae apicales venis sex. Pinnae lanceolatæ longe falcato-acuminatae, 10-11 pollicares, basales 1-1/2-2 pollicares latae, mediae 1-11/2, apicales 3-1/2, sparse pubescentes ad margines et venas subtus.

Spadices e vaginis foliorum viventum orti, simplices, pedunculis bipollicaribus. *Spatha* interior falcato lanceolato, lignea, inermis, compressa; *Spatha* exterior coriacea. *Baccæ* cujusquæ spadicis 5-8, oblongæ 1/2 × 1/3 polliacares. Quæ laeves nigræ. (Trail).

Hab. *in monte Curumu hanc speciem jam collegeram et dipinxeram. quam mihi deditissimus et clarissimus botanicus Dr. James Trail exemplar apud Aveiros, ad fluvium*

Tapajós repertum benevolentissime exhibuit. Quum eum certiorem facerem, ipsam nondum classificatam esse, inter nos conventum est, ut hoc nomine afficeretur. Neque flores, neque fructus vidi

(Barb. Rod. hb. Palm. 327).

7. B. umbrosa. — Stipite mediocri, altitudine 1^m,5-2 diametro 0^m,015, aculeato, solitario (raro 2-3,) frondibus interrupte-pinnatis ; petiolo aculeato (aculeis compres- sis, ad extremam partem ferme nigris), invaginante, (parte invaginante aculeis parvis, aculeorum petioli similibus) ; foliolis 2-4-gregatis, quorum 4-5 fasces utrinque, apicalibus minoribus 6-7-aggregatis utrinque.

Hab. *in edidis silvis ad fluvium Trombetas. Neque flores neque fructus vidi.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 331)

8. B. arenaria. — Stipite humili, inermi, vestito vaginis persistentibus frondium quæ sunt suberectæ, indivisæ aut interrupte-pinnatae ab uno latere, bifidæ, cuneatæ ; petiolo invaginante (vagina aculeata); spadice sub-erecto, indiviso ; spatha inermi. -

Hab. *in tractibus sabulosis ad origines fluvii Hauin-chá, qui influit in flumen Jamundá. Flores et fructus virescunt octobri. Crescit simul cum Attalea agresti.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 363)

9. B. marajá-y. — Stipite humili, inermi; tomento lanato-tabacino conctecto; frondibus interrupte-pinnatis, vagina aculeata ; foliolis 2-3-jugis, oblongo-lanceolatis, acuminatis ; spadice 5-partito ; drupa coccinea, inermi, diametro 0^m,007.