

## Integrifolia. § acanthospatha.

**3. B. Trailliana.** — Palma acaulis. Frondibus integris cuneato-lanceolatis, bifurcatis, 1<sup>m</sup>,45 longis, 0<sup>m</sup>,36 latis; petiolo tomento ferrugineo obsito, lateraliter aculeato; aculeis bijugis. Drupa semi-turbinata, aculeis nigris, undulatis obsessa, rubra.

**Hab.** in lacum Caypurú et rivum (igarapé) Parauacu sub umbris silvarum. Fructus maturescunt februario.

(Barb. Rod. hb. Palm. 352)

**4. B. gracilis.** — Stipite humili, inermi, erecto; frondibus indivisis (foliolis connexis) furcato-bipartito 8-nervatis; petiolo basi invaginante, oblique truncato, aculeato; spadice simplice; spatha tenuiter aculeata; drupa turbinata, coccinea. Habitu *B. simplicifrons* Mart.

**Hab.** in insula Apuhy contra cataractas ejusdem nominis fluvio Tapajós sub umbris silvarum. Fructus maturescunt augusto.

(Barb. Rod. hb. Palm. 226)

**5. B. armata.** — Stipiti mediocri; petiolo ad basim invaginante, aculeis subflavis ad extremitatem nigris vestito, supra vaginam paulo aculeato; frondibus indivisis, cuneatis, bifidis, ad margines sinuatis, cilia-