

* *

(PINNATIFIDA AGGREGARIA)

21. *B. monticola*. — Stipite mediocri, erecto, inermi, solitario; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 5-4-jugis, lanceolatis; falcatis, longe acuminatis; spadice curvo, ramoso; spatha ad verticem aculeata; drupa globulosa, atro-rubra, parva.

Hab. *in superiore parte montis Taperinha in districtu Santarem in Provincia Paraensi. Fructus matu- rescunt junio.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 235)

22. *B. umbraticola*. — Stipite mediocri, aculeato: frondibus interrupte-pinnatis; petiolo et rachide aculeatis; foliolis bijugatis, falcatis, acuminatis; flore femineo, calyce inermi tridentato, corolla majore sub tridentata, aculeata; ovario paulo aculeato.

Hab. *in iisdem locis, efficit cæspites 10-15, arundinaceas, quæ locos humidos prædiligunt. Floret septembri.*

23. *B. paucijuga*. — Stipite mediocri, erecto, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis bijugis, longe lanceolatis, longe acuminatis, ad eam partem dense ciliatis; spadice ramoso, curvo; spatha interiore aculeata tantum dorso (aculeis sub-fusceis basi ferme nigra).

Hab. *in campis ad Santarem in vicinia montis Pi- quiatuba, locis uidis.*

(Barb. Rod. hb. Palm. 224)