

Na tribu *Cocoinae aculeatae*, encontrei uma especie, que, posto que achada por Langsdorf, Riedel, etc., não a encontrei classificada, em obra ou revista alguma; talvez esteja em algum herbario. Esta especie é muito vulgar e pertence ao genero

BACTRIS, Jacq. ✓

1. *Bactris vulgaris*. B. caudice humili, caespitoso, aculeato; foliis aculeatis, semi-erectis, foliolis in gregibus dispositis, patentibus, discoloribus, extremis latioris et minoribus; spathâ interna aculeatâ, aculeis tenuissimis; spadice 5-7 partito; floribus foemineis, calyce annulare, tridentato; corolla aculeatâ calyce majore; drupâ globulosâ, semi-depressâ, stigmatate persistente; albumine corneo, solido.

Hab. em soqueiras, nas florestas do Corcovado e do Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Florece quasi todo o anno. É conhecida pelo nome indigena de AYRI-MERIM.

Entre as *Cocoinae inermes* encontrei algumas especies, que supponho serem novas, posto que duas sejam muito vulgares no Rio de Janeiro. Confrontando as descripções e as figuras de Martius com as especies em questão, afastam-se inteiramente quer nas flores, quer nos fructos. Uma das especies que passa por ser de Martius é a impropriamente

classificada no Rio de Janeiro por *Syagrus bothryophora*, Mart., e por *S. comosa*, Mart. e que vulgarmente é conhecida por *Coco de baba de boi*. Comparando os specimens que encontrei em Minas, em estado selvagem e cultivado, e os do Rio de Janeiro, de diversas localidades, com as descrições e as estampas de Martius, quer do *Genera palmarum*, quer do *Palmetum Orbignianum*, nenhuma caracteriza a especie, pelo contrario afasta-se não só nas flores, como nos fructos, tendo alguma affinidade somente no porte, como claramente demonstro no meu *Sertum palmarum*.

COCOS, L.

1. Cocos geriba'. C. caudice procero, regulariter annulato; foliis erecto-patentibus; foliolis linearibus, acuminatis, densis, sub-crispis, in greges sub-regulariter insertis; petalis masculis oblongo-lanceolatis, acutis, crassis; foemineis ovato-orbicularibus, apice in dorso subcarinato; androeceo abortivo annulare, sub-tridentato; ovario globoso-depresso, tomentoso; drupis ellipticis, confertis, mucilaginoso, semi-umbonatis, flavescentibus, ovi columbini magnitudine, vel minoribus; endocarpo oblongo, vertice conico rostrato; nucleo profunde-transverse sulcato.

Hab. nas florestas de Minas Geraes, em diversas localidades, onde é conhecida pelo nome de GERIBÁ ou PALMITO AMARGOSO; no Rio Grande do Sul e no Paraná