

Hab. in superiore parte montis Curumu, plus ducentis pedibus super fluvium Trombetas. Fructus maturescunt aprili.

(Barb. Rod. hb. Palm. 358)

10. *B. sylvatica*. — Stipite mediocri, aculeato; frondibus interrupte-pinnatis; foliolis 2-4-jugis; spadice inermi, ramoso; spatha inermi; floribus femineis: calyce inermi, majore quam corolla aculeata, tridentata breviter ciliata; ovario inermi.

Hab. in silvis ad margines fluvii Irurá in flumen Tapajós influentis. Floret junio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 221)

11. *B. xhantocarpa*. — Stipite humili, arundinaceo frondibus indiviso-falcatis; spadice bipartito, raro simplici; drupa globosa-turbinata, lutea.

Hab. in tractu ad cataractas fluvii Trombetas sito. Fructus maturescunt martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 340)

12. *B. inermis*. *Trail.* — Palma inermi, mediocri arundinacea, 1^m alta, diametro 0,^m005; fronde pinnata, 8-9 foliolis binis primis erectis et extremis connexis, lineari-lanceolatis, falcatis, acuminatis; spadice bipartito; fructibus subglobosis, diametro 0,^m005, rubris.

Hab. in silvis ad lacum Tapagem in fluvio Trombetas. Fructus maturescunt martio.

(Barb. Rod. hb. Palm. 348)

VAR. *tenuissimis*.

Est species quedam, spadice bipartito carens, cu-