

## Gen. BACULARIA F. v. Mueller.

*Benth. et Hook. Gen. plant. III, p. 903.*

**BACULARIA ALBERTISIANA** Becc. sp. n. — **LINOSPADIX** sp. n.º 208, Becc. in *D'Alb. Nuova Guinea, vol. II, p. 399.* — Gracilis. Frondes simplices profundissime furcatae, sive segmentis duobus (rarissime 3-4) basi connatis, 7-nerviis, circiter 30 cent. longis, 2-2½ cent. latis, ad apicem parum attenuatis, brevissime obtuseque denticulatis compositae; petiolo acute trigono. Spadix gracilis, basi longe nudus, in facie exteriori convexiusculus antice planus, marginibus acutis, floribus in parte apicali non incrassata spiraliter dispositis; scrobiculis superficialibus; fructibus angustis, elongatis, fusiformibus, levissime curvulis, utrinque attenuatis, 15 mill. long., 3½ m. latis.

**Abita.** — Alla Nuova Guinea lungo il *Fiume Fly*. D'Albertis 1877.

**Osservazioni.** — È molto vicina alla *Kentia minor* F. v. Muell. (*Bacularia minor* F. v. M. in Herb. Becc.) di cui divide perfettamente l'abito e la struttura del frutto; ma dalla quale si distingue per le foglie con 2 soli o pochissimi segmenti, mentre nella *B. minor*, questi sono numerosi.

## Gen. PTYCHORAPHIS Becc.

*Becc. in Ann. Jard. bot. Buit. II, p. 90 et 126.* — **RHOPALOBLASTHE** (*partim*) *Benth. et Hook. Gen. plant. III, p. 892.*

Flores in eodem spadice infrafoliaceo paniculatim ramoso monoici, in ramorum parte basilari glomerulato-terni, fl. intermedio femineo serotino, in parte apicali masculi gemini aut solitarii. Glomeruli bracteolati spiraliter dispositi. Flores masculi symmetri subglobosi vel ovoidei. Sepala suborbicularia, late imbricata. Petala subtiliter coriacea, valvata. Stamina 6, filamentis basi breviter coalitis, complanatis, subulatis apice tenui inflexo; antherae versatiles; ovarii rudimentum bene evolutum conicum vel columnari, in alabastro staminibus subaequilongo. Flores feminei bibracteolati subglobosi, perianthio post anthesin aucto. Sepala latissima, rotundata, concava, imbricata. Petala sepalis longiora, basi late imbricata, apicibus valvatis. Staminodia parva, pauca (4-6). Ovarium ovoideum uniloculare. Stigmata 3 elongato-triangularia acuta, intus sulcata in anthesi reflexa. Ovulum lateraliter affixum. Fructus ovoideus; stigmatum residuis apicalibus, non vel vix obliquis; pericarpio parce carnoso; mesocarpio tenuiter sub-uniserialiter fibroso-filamentoso; endocarpio tenui, fragili, crustaceo, semini non adhaerente. Semen ovoideum, apice obtusum, superficie aequali; hilo laterali lineari, e basi