

Beccari nimmt, meiner Meinung nach mit Recht, an, daß die unter *Veitchia Storckii* beschriebenen und abgebildeten Früchte nicht zu dem Kolben, sondern zu einer echten *Veitchia* gehören. Er vermutet, daß auch die Wedelstücke nicht hierher, sondern einer dritten Gattung angehören.

Auch diesmal waltet über der Gattung wieder ein Unstern. Ein ganz fremder Kolbenast mit Früchten, von der neuseeländischen, häufiger kultivierten *Rhopalostylis sapida* (Sol.) Wendl. et Drude stammend, liegt dem neuen Material bei. Merkwürdigerweise finden sich aber unter der gleichen Nummer auch Wedelstücke der gleichen Palmenart, wie sie von Wendland abgebildet und beschrieben wurden. Vielleicht gehören sie doch zu *Neoveitchia Storckii*.

Fidschi-Inseln: Viti Levu, Viria (Juli 1932 — A. Meebold n. 16780).

**Balaka microcarpa** Burret nov. spec. — Caudex ex frondis vagina et ex spadice basi circ. 4—5 cm diam. Vagina extus ut rhachis inferne densissime, sed decidue fusco-furfuracea. Petiolus fere nullus, usque 2 cm longus, apice 12 mm in diam., supra applanatus, subtus alte rotundatus. Lamina ex fragmentis visis inter majores, segmenta, ut videtur, regulariter disposita, pro rata valde robusta, rigida. Segmenta apicalia flabellum circ. 20 cm longum, pro rata breviter bifidum, margine lobulato-praemorsum formantia, sequentia oblancoolata, superne vix attenuata, apice oblique lobulato-praemorsa, in margine longitudinali superiore 20—21 cm longa, in dimidia 3,5—4,5 cm circ. lata, nervis robustioribus ut tenuioribus utrinque i. s. vix prominentibus, paulo visibilibus, basi subtus nonnihil excavata. Segmentum infra insertum maximum visum, sed certe haud maximum frondis in margine superiore 26 cm longum, fere lineare, in dimidia 5,5 cm et ultra latum. Segmenta basilaria visa a rhachi surgentia, ima quam reliqua visa minor. Spadix fructifer ab ima basi 45 cm fere longus, 3-plo ramosus, fructifer dense sed  $\pm$  decidue furfuraceus, dense granuloseus. Pedunculus ab ima basi 15 cm longus. Spathae infimae annulus 2 cm supra basin situs, secundae 3,7 cm altius sequens, ubi pedunculus 7 mm in diam. Rhachis 13,5 cm longa, ramis primariis 5 ramosis, 4 simplicibus, imo duplicato-ramoso, ramis secundariis 5, quorum infimo furcato. Rami primarii infimi bractea brevi, late triangulari suffulti. Rami fructiferi superne cernui, longi, circ. 12—22 cm. Axis fructibus distichis subquadrangularis, dimidii circ. rami i. s. in internodiis in fructuum latere 3 mm circ. lata. Fructus in seriebus 2 oppositis longitudinalibus leviter curvatis dispositi, dimidii rami sequentes inter partes aequales 8 mm dissiti. Fructus oblique inserti. Axis

sub fructuum basi leviter producta, bracteas fructiferas late rotundatas, intus costis prominentibus densis percursas, demum interdum vel saepius  $\pm$  fissas gerens. Fructus parvi, i. s. cum perianthio 16 mm longi, in dimidia 9 mm in diam., in rostrum pro rata breve, tenue, 2 mm longum, leviter sed conspicue obliquum contracti. Epicarpium i. s. sclerosomatibus plurimis sat longe lineolatum. Perianthium fructiferum 4 mm altum, fusco-leprosum, cupuliforme. Calyx breviter cupuliformis, inter dimidiam partem et duas tertias corollae altitudine aequans, sepalis late tegentibus, late rotundatis, margine demum saepe breviter fissis. Petala latissime rotundata, apiculo late obtuse triangulari. Semen parvum, normaliter, ut videtur, 5-angulare, 6 mm altum, apice acutum vel potius pyramidato-acutatum, 4,5—5,5 mm in diam. Rhaphe unum angulum secus ab apice ad basin pertensa, rhapsheos ramis oblique per latera descendentibus et, laxe anastomosantibus. Albumen aequabile. Embryo basilaris.

Fidschi-Inseln: Suva (August 1932 — A. Meebold n. 16418).

Zum näheren Vergleich kommt nur *B. spectabilis* in Frage, von der nur der Kolben bekannt ist. Sie ist zweifellos schon deshalb verschieden, weil ihr im Blütenzustand befindlicher Kolben, also jedenfalls von Jugend auf, völlig kahl ist. Charakteristisch sind auch die relativ kleinen, recht eigentümlichen Früchte sowie der fast völlig sitzende Wedel von *B. microcarpa*.

**Balaka microcarpa** var. **longieuspis** Burret nov. var. — „Palma  $\pm$  12 m alta, caudice gracili, 5—6 cm in diam.“ Frondes ex fragmentis segmentis regulariter dispositis. Rhachis praecipue subtus dense sed decidue furfuracea. Segmenta valde robusta, apicalia ad dimidiam connata, maxima dimidiae vel potius inferioris rhacheos visa oblanceolata vel potius superne linearia, 50 cm fere longa, superne 5 cm fere lata, apice oblique lobulato-praemorsa, margine superiore producto. Segmenta infima, ut videtur, a rhachi surgentia, subtus ad basin fusco-leproso-punctata. Spadix flores  $\sigma$  juveniles gerens usque ad apicem fere spathis 2 involucrata. Spatha inferior 25 cm longa, cylindrica, anguste vaginans, fusco-lepidoto-punctata, superior quam inferior 25 cm longior, superne sensim dilatata, aperta, extus fusco-furfuracea. Rami breviter furfuraceo-tomentosi. Spadix fructifer 65 cm longus. Pedunculus, ut videtur, 21,5 cm longus, supra basin 1,5 cm fere in diam. Rami majores visi 20—25 cm longi, furfuracei, granulosi. Fructus in seriebus 2 oppositis, leviter curvatis dispositi, usque 12 mm inter partes aequales dissiti, cum rostro et perianthio i. s. 18 mm longi, infra dimidiam 8 mm in diam., supra in rostrum longum, tenue, acutum, 4 mm longum contractum et