

SPECIE ESCLUSE DAL GENERE CYPHOKENTIA.

**Cyphokentia Savoryana** Rehder et Wilson in Sargent, Journ. Arnold. Arb. I, n. 2 (1919) 115 = *Bentnickiopsis Savoryana* Becc. ms.

**Cyphokentia? carolinensis** Becc., in Engl. Bot. Jahrb. LII (1914) 10 = *Bentnickiopsis carolinensis* Becc. ms.

Per queste due Palme, alle quali va aggiunta quella qui sotto brevemente descritta, ho creduto stabilire un genere nuovo, per il quale propongo il nome di *Bentnickiopsis*, a motivo della sua grande rassomiglianza con le malesi *Bentnickia*.

**Bentnickiopsis ponapensis** Becc. — Elata, foliorum segmenta lineari-ensiformia, longissime acuminata et apice profundissime bifida, 3-costulata, subtus minute punctulata; intermedia circ. 80 cm. longa et 3 cm. lata. Flores ♂ ovato-subtrigoni, 3,5-4,5 mm. longi, sepalis in margine hyalinis, erosis. Fructus late obovato-oblongus, compressus, 18-20 mm. longus, 14-15 mm. latus, 10 mm. crassus, in sicco ad latera costulis nonnullis conspicuis arcuatis notatus; stigmatum residuis prominulis, circiter ad medium sitis. Semen oblongum subreniforme, compressiusculum, 13 mm. longum, 10 mm. latum, 8 mm. crassum.

In Insula Ponape, Carolinarum (Ledermann, n. 13201 et n. 13623, in Herb. Berol.).

Il genere *Bentnickiopsis* è caratterizzato nel modo seguente:

Palmae elatae, foliis pinnatis, segmentis acuminatis. Flores in scrobiculis semilunatis leviter excavatis positi, bracteolati. Flores ♂ symmetrici. Stamina 6, filamentis apice inflexis, ovarii rudimento conico, tridentato, in alabastro staminibus breviori. Ovulum infra apicem loculi pendulum. Fructus parvus, oblongus; stigmatum residuis infra apicem vel prope medium lateris sitis. Mesocarpium sclerosomatum strato periferiali praeditum, interne parce fibrosum. Endocarpium tenue, lignoso-osseum, operculo scistili, embrioni opposito, praeditum. Semen ovoideum, infra loculi apicem vel prope medium, absque spermatophoro, insertum, ± ascendens, hilo orbiculari; rapheis ramis numerosis, nonnullis centralibus ascendentibus, verticem superantibus et fere indivisis, lateralibus arcuatis. Albumen aequabile. Embryo basilaris.

**Dolicokentia** Becc. gen. n. — *Cyphokentiae* sp. Ad. Brongn., in Compt. Rend. Ac. Sc. Paris, LXXII (1873) 400.

Caratteri generici: Palma assai robusta. Foglie... Spadici molto ramosi; ramoscelli fioriferi crassiusculi, allungati, portanti molto regolarmente disposti lungo 5 serie longitu-