

ckii H. Wendl. Dallo studio accurato che io ho fatto di queste palme mi risulterebbe che la *V. Storckii* si allontana molto dalle altre *Veitchia* ed io per questo reputo opportuno di creare per essa il nuovo genere *Neoveitchia*. Alle tipiche *Veitchia* poi io ho da aggiungere, oltre alla *V. arecina* neocaledoniana qui adesso descritta, altre due specie, la *V. Metiti* Becc. e la *V. Hookeriana* Becc. delle quali mi limito per ora a pubblicare qui sotto una breve diagnosi insieme a quella del nuovo genere creato per la *Veitchia Storckii*.

Veitchia Metiti Becc. sp. n. — Fructus ellipticus, utrinque aequaliter attenuatus, 4,5 cm. longus, 2 cm. crassus. Perianthium fructiferum profunde cyathiformi-cupulare, 14-15 mm. longum, et 17 mm. in ore latum, tertiam fructus inferiorem partem vestiens. Semen ovatum, utrinque aequaliter rotundatum. — In insula Vanua Lava, Novarum Hebridarum.

Ho rammentato questa Palma nella « Webbia », III, 153, sotto il nome di *Exorrhiza Wendlandiana*. È affine alla *V. Joannis*, dalla quale si distingue per il suo calice ciatiforme assai profondo, per i suoi frutti ellissoideo-fusiformi e per il seme ovoideo-ellittico, egualmente arrotondato alle due estremità.

Veitchia Hookeriana Becc. sp. n. — Flores ♂ ovati, superne attenuati, acuti; antheris anguste sagittatis, apice bicuspidatis. Fructus regulariter ovatus, basi rotundatus, superne conicus, apice obtusus, 43-45 × 25-28 mm. metiens. Semen ovato-ellipsoideum, utrinque subaequaliter rotundatum; rapheis ramis laxe reticulatis. Perianthium fructiferum depresso cupulare, quintam fructus partem vestiens. — Patria dubia.

L'esemplare tipico di questa specie si trova nell'Erbario di Kew con l'etichetta: Brisbane (Hort.?) W. Hill. may 1881. Poi Brisbane è stato scancellato col lapis e pure col lapis vi è stato sostituito di mano di Hooker « Cardwall » (letter).

I frutti hanno la forma e grandezza di quelli della *Veitchia arecina*. È caratterizzata dal perianzio fruttifero molto poco profondo perché il frutto ha una base molto larga, ma specialmente dai fiori ♂ con antere angustissime con l'apice bifido e quindi con le logge terminate in punta subulata acutissima.

Neoveitchia Becc. gen. nov. *Veitchia* sp. H. Wendl. — Frondium segmenta acuminata. Spadix amplus decompositus. Ramuli floriferi elongati, in parte basilari crassiusculi et flores ♀ pauci solitarii (non glomerulato-3-nati, intermedio ♀ et lateralibus masculis). Flores ♂ symmetrici, in scrobiculis bini et superpositi (non collaterales);