

21/573 II. **Calamus bacularis** BECC.

Volksnamen. Mal. Serawak: *Rotan tjempaka*.

Niet-klimmende, 2 M. hooge bergrotan, gebruikt voor wandelstokken (Beccari).

21/573 II. **Calamus billitonensis** BECC.

Volksnamen. Mal.: *Rotan ramit*.

Authentiek, van Billiton ontvangen materiaal is een gladde, 5 mM. dikke rotan met leden ter lengte van ca 35 cM. Het oppervlak is glanzend geelbruin, het hart grauw. Zij maakt den indruk een goed splijtbaar, taai bindrotan te zijn, doch gegevens omtrent voorkomen, gebruik en waarde ontbreken, behoudens dat de hier klaarblijkelijk bedoelde soort in het Tijdschr. d. Ind. Mij v. N. & L. dl 19, bl. 120 wordt genoemd onder de rotans van Billiton, die tot binden en bij den huisbouw worden gebezigd.

In het Museum: Rotan.

21/573 II. **Calamus bonienseis** BECC.

Volksnamen. Boeg.: *Tomani*.

Van deze soort, in Boni niet zeer algemeen, werd mij bericht, dat zij zoowel voor plaatselijk gebruik als voor den uitvoer gezocht is. De gladde stangen zijn 5 tot 8 mM. dik en de lengte der leden bedraagt 15 à 20 cM. Het oppervlak is stroogeel, glimmend, overlans gegroefd; de pit is licht. Zij is goed splijtbaar en zou of onvermengd, of vermengd met *rotan djarmasin* (zie onder Cal. *lejocaulis*) worden uitgevoerd. De Heer Kohlrusch deelde mij mede, dat dit vermoedelijk de somtijds in groote hoeveelheden onder de *rotan roenti* aangetroffen rotan ajër-soort is, die haar glazuurlaag niet loslaat, dwz. niet geroenti kan worden; zij wordt in de fabriek onderworpen aan een chemische behandeling en is dan even bruikbaar als de echte, tamelijk hoogwaardige roenti-soorten van Celebes.

In het Museum: Rotan.

21/573 II. **Calamus brachystachys** BECC.

Volksnamen. W. Borneo: *Rotan landak* — Z. & O. Afd. v. Born.: *R. panggroengroeng*.

Van *rotan landak* ontving het Museum van Pontianak zonder bijzonderheden één stang, ca 10 mM. dik, met sterk inspringende knoopen; de lengte der leden bedraagt 20 à 25 cM. Het klevende oppervlak is glimmend bruingeel met zwarte ringen om de knoopen, het hart grauw en poreus. Deze rotan is soepel, doch minder gemakkelijk te splijten.

Ook van *panggroengroeng* van de Z. & O. Afd. v. Borneo, door Beccari met zekerheid gedetermineerd als *C. brachystachys* (No. 2490), bezit het Museum slechts een klein monster, beantwoordend aan de volgende beschrijving: dikte ca 10 mM. met sterk inspringende knoopen, die echter niet zijn voorzien van een zwarten ring; lengte der leden ongeveer 20 cM. Het niet-klevende oppervlak is glimmend geel, dwars gestreept, het hart grauw en dicht. Deze rotan is soepel en gemakkelijk te splijten, doch dit kleine monster maakt, evenals het vorige, niet den indruk van een waardevolle rotansoort. De Borsumij noemde *panggroengroeng* een taai, buigzame rotan, die echter van Bandjarmasin niet wordt uitgevoerd.