

ciliolato-spinulosis, supra in costa media, acuta, et in duobus nervis lateralibus, tenuibus, nec non subtus secus solam costam mediam, longiuscule ciliolato-spinosis. Spadices elongati, spathis spinis brevibus reduncis armatis; floribus in amenthis 5-7 cent. longis disticis.

Abita. — Raccolsi fiorifero ad *Andai* nella Nuova Guinea nel 1872. (P. P. n.º 771). Possiedo della medesima specie un esemplare, raccolto da D'Albertis sul *Fly-River*.

Osservazioni. — È specie caratteristica per le grandi ocee, le quali sebbene si sfilaccino e marciscano, persistono assai lungamente anche nelle fronde adulte. Appartiene alla sezione *Coleospathae* di Griff. ed ai *Loriferi* di Martius.

**CALAMUS PAPUANUS** *Becc. sp. n.* — *CALAMUS sp. n.º 47, Becc. Malesia v. I, p. 88.* — Caudex scandens, tenuis, gracilis, longissimus, 6-8 mill. diam., loris filiformibus prope basin remotiuscule, prope apicem densius, redunco-spinulosis. Frondes breves ( $\pm$  30 cent. longae), non cirriferae, vagina tuberculis parvis raris spinescentibus sparsa, ad apicem gibba; ocea brevi (3-5 mill.) annulari, truncata; petiolo brevi (2 cent.) ad margines spinuloso; rhachi spinis reduncis inordinate armata; segmentis paucis, circiter 14, inaequidistantibus et fasciculatim 3-4-approximatis, per paria oppositis, 2 terminalibus fere usque ad medium confluentibus, e basi angusta oblongo-obovatis vel oblanceolatis acuminatis acutissimis, glabris, nitidis, subconcoloribus, costa tenui acuta, nervis primariis super. utrinque 2 tenuissimis, margine acuto non ciliato.

Abita. — Alla Nuova Guinea a *Ramoi* (P. P. n.º 421).

Osservazioni. — È specie affine al *Calamus Javensis* Bl.

**CALAMUS INTERRUPTUS** *Becc. sp. n.* — *CALAMUS sp. n.º 46, Becc. Malesia v. I, p. 88.* — Caudex scandens mediocris, 15-20 mill. diam.; loris robustis teretibus fortiter semiverticillatim redunco-armatis, in parte basilari compressis, marginibus acutis sursum spinulosis. Frondes non cirriferae 1 m. 50 cent. longae; ocea subnulla; vagina fugaciter furfuracea, subglaucescens, inconspicue gibbosula, spinis raris e basi lata subtus concava complanatis, anguste lanceolatis, 15-20 mill. longis, solitariis, raro contiguis, deorsum inclinatis armata, sensim in petiolum, basi profunde canaliculatum, subtus rotundato-inerme, marginibus acutis membranaceis, continuata; rhachi aculeis reduncis sparsis vel approximatis usque ad apicem armata, segmentis interrupte remoteque fasciculatis, anguste lanceolatis apice acuminatis, 25-35 cent. longis, 2  $\frac{1}{2}$ -3 cent. latis, firmulis, viridibus concoloribus, glabris, haud setulosis, subnitidis, margine acuto nudo, terminalibus basi confluentibus.

Abita. — Nuova Guinea a *Ramoi* (P. P. n.º 420).

Osservazioni. — Non saprei indicare le affinità di questa specie. Appartiene ai *Loriferi* Mart.