

t. 173. 1908.— *C. latifolius* Kurz (not of Roxb.) in Journ. As.Soc. Beng. **43**(2): 210. t. 21A. 1874 et For. Fl. Brit. Burma **2**:518 1877 (partly).

云南 (Yunnan): 勐腊 (Mengla), 陈三阳 18866, (云南热带植物所栽培, 引自勐腊)。

我国分布新记录; 缅甸丹老, 印度安达曼与尼科巴群岛有分布。

12. 长穗省藤 新变种

Calamus palustris Griff. var. ***longistachys*** S. J. Pei et S. Y. Chen, var. nov.

A typo imprimis recedit inflorescentia mascula c. 1.5 plo longiore, inflorescentia partiali longiore.

Yunnan (云南): Mengla (勐腊), YNTBI cult. introd. from Mengla (云南热带植物所栽培, 引自勐腊), 1979. 10. 3., S. Y. Chen (陈三阳) 18865 (♂ fl. Typus, YNTBI).

13. 滇越省藤 新拟

Calamus palustris Griff. var. ***cochinchinensis*** Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind. **2**:211. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. **11**(1): 405. t. 175. 1908; Conrard in Lecomte, Fl. Gen. Indo-chine **6**:1036. 1937. — *C. latifolius* auct. non Roxb.: Wei in Guihaia **6**:36. 1986. (杨增宏 12001).

云南 (Yunnan): 勐腊 (Mengla) 尚勇 (Shangyong), 杨增宏 12001; 麻栗坡 (Malipo) 老居山保护区, 陈三阳, 童绍全 18974。

我国分布新记录; 柬埔寨, 越南有分布。

标本杨增宏 12001 与 *C. latifolius* Roxb. 不同之处在于: 雌花序显然较长, 下部的分枝花序也较长, 小穗较多, 总苞托(与原种相似)半伸出于各自的小佛焰苞(后者则被包进小佛焰苞内), 总苞稍超出总苞托(后者套入总苞托内), 故应归入本变种。

14. 大藤 新种 图 2

Calamus wailong* S. J. Pei et S. Y. Chen, sp. nov.—*C. platyacanthus* auct. non Warb. ex Becc.: Wei in Guihaia **6**: 36. 1986. (杨增宏 12405).

Species *C. palustris* Griff. affinis, imprimis var. *amplissimum* Becc. similis, sed spinis vaginae subtiliter longioribus; inflorescentia feminea robustiore et longiore; inflorescentiis partialibus et spiculis longioribus et pluribus; afuamis fsuctus 19—21-seriatis; segmentis saepe solitariis vel raro prope 2 aggregatis. *C. platyacantho* Warb. ex Becc. spina et forma vaginata imprimis similis, sed qui inflorescentia feminea brevior, frondis segmentis 2—4 aggregatis; perianthio fructifero conspicue pedicellato; fructo leviter magiore differt.

Caulis scandens, robustus; caulis cum vagina 4 cm diam., exvaginatus c. 2 cm diam. Frondes magnae, partibus segmentatis 1.5—2.5 m longis, apice cirrhaetae 1.5—2.5 m longae; rhachis supra et juxta marginem dilute densa breviter stricto-spinosa, subtus in utroque margine sparsim stricto-unguiculato-spinosa, secus medium unguibus solitariis vel 2—3 aggregatis ornata, apice cirrho semiverticillatim unguilatiformi producta; segmenta magna inaequaliter distantia disposita, lanceolata, 50—55 cm longa, 5—7 cm lata, versus basi angustata, apice acumine setiforme ornata,

* “wailong” 为傣语 (Dai language) 大藤 (big rattan) 之意。