

CALAMUS FLABELLATUS Becc. sp. n. — Caudex scandens, gracilis, tenuissimus, vaginatus 5-6 mill. diametro, loris gracilibus, tenuiter redundo-armatis, basi compressis, marginibus acutis, nudis. Frondes flabellato-spathulato-oblongae, usque ad tertiam partem furcato-fissae, ± 45 cent. longae, 10 cent. latae, virides, concolores glabrae, plurinerviae, haud setulosae vel spinulosae, lobis lanceolatis, acuminatis, costa media subtus remote retrorsum aculeata; petiolo 3-4 cent. longo; ocrea brevissima aut subnulla; vagina ore obliqua, cylindrica, omnino inermi, glabra, longitudinaliter striata.

Abita. — A Borneo sul Monte Mattan̄g presso Kutciñg. Giugno 1866. (P. B. n.º 1911). Dai Malesi è chiamato « Rotañg Bermàn. »

Osservazioni. — Appartiene al gruppo dei *Loriferi*, e sebbene molto distinto da tutte le specie a me note, mi sembra debba collocarsi in prossimità del *C. Javensis*, del quale ha dimensioni anche minori. L'esemplare descritto si compone della porzione intermedia di un caudice adulto. Le fronde sono quindi di pianta bene sviluppata. Vi sono altre specie di *Calamus* che hanno le fronde radicali indivise, sia nelle piante giovani, sia in quelle adulte; ma nessun'altra ne conosco, che le offra tutte di questa forma nella parte alta del caudice.

CALAMUS PYGMAEUS Becc. sp. n. — Humilis, subacaulis, gracillimus, basi radicans. Frondes 45-50 cent. longae, non cirriferae, ocrea brevi ligulaeformi, decidua; vagina brevi, dorso spinis planis, 4-7 mill. longis, saepe pectinatim confluentibus, deorsum flexis, seriatim armata; petiolo subtereti supra anguste canaliculato, 16-18 cent. longo, spinis rectis ad basin crebrioribus sparso; rhachi inermi fugaciter furfuracea; segmentis regularissime disticis, alternis, utrinque 20-23, angustissime lanceolatis, apice acuminatis, rigidulis, viridibus, concoloribus, margine serrulato-spinulosis, in apice ad margines secus costam medianam et ad nervos primarios superiores setosis. Spadices tenuissimi, filiformes, folio longiores, spathis angustissimis inermibus, ramis paucis, spicis brevibus, floribus remotis, fructibus parvis.

Abita. — A Borneo sul Monte Mattan̄g presso Kutciñg. Giugno 1866. (P. B. n.º 1924).

Osservazioni. — Elegantissima Palma, certamente la più piccola del Genere. Sembra debba rientrare nel gruppo del *Calamus ciliaris*.

CALAMUS TRIQUETER Becc. sp. n. — Caudex scandens, pulchre triqueter, vaginatus ad 2 cent. crassus. Frondes cirriferae ultrametrales, ocrea truncata brevi (2 cent.); vagina triquetra, angulis acutiusculis spinis rectis brevibus horizontalibus armata, faciebus subplanis laevibus; petiolo trigono supra piano, 15 cent. longo, ad margines acutos et in dorso redundo-spinoso; rhachi supra acuta, subtus spinis simpli-cibus redundis medialibus, in cirro crebrioribus et semiverticillatis, armato; segmentis