

CALAMUS INTERRUPTUS var. **DOCILIS** Becc. — **CALAMUS** sp. n.^o 42, Becc. *Malesia v. I*, p. 88. — A forma typica differt vagina inermi et caudice graciliori (semper?).

Abita. — Con la forma tipica a *Ramoi* (P. P. n.^o 418).

Osservazioni. — È possibile che quando saranno conosciuti gli spadici ed i frutti di questa forma, si riscontrino altre differenze, le quali consiglino di elevare il nome di *docilis*, dal grado di varietà a quello di specie.

CALAMUS SERRULATUS Becc. sp. n. — **CALAMUS** sp. n.^o 48, Becc. *Malesia v. I*, p. 88. — Caudex scandens, digitus minoris crassitie, loris filiformibus basi inermibus. Frondes non cirriferae 1 m. 50 c. longae; ocrea nulla (vel decidua?); vagina non vel vix in dorso gibba, remote irregulariterque spinis e basi crassa rectis horizontalibus 5-15 mill. longis sparsa, apice parum dilatata et ore obliquo truncata in petiolum basi profunde canaliculatum subtus rotundatum, ad margines remote spinulosum, sensim transeunte; rhachi subtus rotundata, secus lineam medianam, in parte basilari et media fere inermi, lateraliter redundo-aculeato-armata, in parte apicali aculeis crebrioribus medialibus aucta; segmentis concinnis creberrimis numerosissimis, alternis vel fere oppositis, strictis, rigidulis, nitidis, viridibus, concoloribus, linearibus, acuminatis, 15-16 cent. longis, 8-10 mill. latis, margine minutissime creberrimeque spinuloso-serrulatis, secus costam medianam utrinque et ad nervos primarios tantum in facie superiore remote, sed distincte spinuloso-setosis.

Abita. — Nuova Guinea a *Ramoi* (P. P. n.^o 419).

Osservazioni. — Appartiene alla sezione dei *Loriferi* di Martius, e con tutta probabilità, sebbene non possegga che esemplari sterili, alla sezione *Coleospathae* di Griffith.

CALAMUS ARUENSIS Becc. sp. n. — **CALAMUS** sp. n.^o 45, Becc. *Malesia v. I*, p. 88. — Caudex scandens crassus (3-4 cent. diam.) non lorifer. Frondes cirriferae ampliae, vaginis laevibus omnino inermibus apice saccato-gibbosis; ocrea brevissima; petiolo subnullo; rhachi crassa, ad basin supra plana, subtus convexiuscula inermi, 2 cent. lata, a medio usque ad apicem aculeis brevibus reduncis sparsa; segmentis glabris, utrinque viridibus, plurinerviis, margine parce breviterque, prope apicem densius, spinulosis, ciliatis; segm. basilaribus parvis prope vaginam insertis; intermediis lanceolatis utrinque attenuatis 45-50 cent. longis, 8 cent. latis. Spadices diffusi ampli, spathis tubulosis, dorso tantum prope apicem carinatum breviter redundo-armatis; fructibus pisiformibus.

Abita. — A *Giabu-leñgan* nelle Isole Aru. Maggio 1873.

Osservazioni. — Sembra affine al *Calamus pisicarpus* Bl. delle Molucche, dal quale differisce per la vagina completamente inerme. Appartiene alla sezione *Coleospathae* di Griffith ed ai *Cirriferi* di Martius.