

costole setose (Becc., « Asiatic Palms, Lepidocaryeae », in Ann. Bot. Garden Calc. v. XI, plate 217).

Calamus siphonopathus var. **polylepis** Becc.

ABITA. — *S. Isidro*, prov. Morong (Vidal n. 4068). L'esemplare rappresentante questo numero è riprodotto nella mia Tav. 216 dell'opera sopra citata ma non ancora pubblicata.

OSSERVAZIONI. — Spate primarie appena spinulose; infiorescenze parziali densiflore e relativamente grandi; frutti con squame sopra 18 ortostiche; segmenti stretti con 3 costole spinoso-setolose di sopra.

PROSPETTO DELLE VARIETÀ
DEL « CALAMUS SIPHONOSPATHUS ».

- C. siphonopathus** Mart. (*typus*). — Caudicis vaginae \pm spinis pallidis gracilibus armatae; frondium petiolus et pars basilaris rachis utrinque spinosus; segmenta linearia angustissima costulis 3 supra spinulosis percursa; spathae aculeolatae; inflorescentiae partiales ramosissimae densiflorae; fructus squamae in orthostichis 15 dispositae.
- C. siphonopathus** var. **sublevis** Becc. — Caudicis vaginae parce spinosae vel inermes; frondium petiolus et pars basilaris rachis utrinque spinosus; segmenta linearia angustissima costulis 3 levibus vel parcissime spinulosis percursa; spathae omnino inermes; fructus squamae in orthostichis 15 dispositae.
- C. siphonopathus** var. **oligolepis (major)** Becc. — Frondium segmenta angustissime lanceolata costulis 5 supra setosis percursa; spathae primariae aculeolatae; fructus squamae in orthostichis 12 dispositae.
- C. siphonopathus** var. **oligolepis (minor)** Becc. — Minor, frondium segmenta parva costulis 3 setosis percursa; fructus squamae in orthostichis 12 dispositae.
- C. siphonopathus** var. **polylepis** Becc. — Frondium segmenta linearia costulis 3 setoso-spinulosis supra percursa; spathae aculeolatae; inflorescentiae partiales densiflorae; fructus squamae in orthostichis 18 dispositae.