

14. ? *Ch. fragrans* Mart. Hist. II. p. 4, t. 3 fig. 1 et 2. Kunth Enum. III. p. 172 no. 7. *Nunnezharia fragrans* Ruiz. et Pav. Prodr. flor. per. et chil. p. 137 t. 31. Eorund. Syst. veg. flor. per. et chil. p. 294. *Nunnezia fragrans* Willd. spec. plant. IV. 2 p. 1154.

bb. Frondes pinnati.

α. pinnis extimis erecto-patentibus.

15. *Ch. Lindeniana* Hrm. Wendl. in Otto et Dietr. Gartenz. 1853 no. 18 p. 139.

16. ? *Ch. flavovirens* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnatis, flavovirentibus, vaginis cylindricis apice paululo apertis et subauriculatis, petiolis subrotundis, basi supra callosis, evanescente applanatis, rhachi supra subrotunda, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida distincte notatis, pinnis remotis utrinque 6—7, oblongis, falcatis, basi contractis, acuminatis, apicibus pendulis, summis confluentibus, nervis primariis et secundariis 7—9.

Patria ignota.

Caudex diametro 7—9 lin., annulis 4—5 poll. distantibus. Frondes $3\frac{1}{2}$ —4 ped. longae, vagina 8—10 poll., petiolo 5—7 poll., rhachi 2 ped., pinnis 10—11 poll. longis, 3— $3\frac{1}{2}$ poll. latis.

Species fronde similis quidem est *Ch. lunatae* Liebm., *Ch. concolori* Mart. et *Ch. Lindenianae* mihi, sed ex iis sat distincta. Inflorescentiam nondum vidi, itaque ejus characteres serius exponendi sunt.

17. ? *Ch. Bartlingiana* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnatis, glaucescentibus, vaginis basi cylindricis, apice oblique longeque apertis, subauriculatis, in petiolum teretiusculum supra applanatum vel paulo cana-

liculatum attenuatis, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida notatis, pinnis remotis utrinque 5—6, elongato-lanceolatis, falcatis, longissime acuminatis, marginibus recurvis, apicibus paullo pendulis saepe semitortis, summis in lacinium latissimum confluentibus, supra opacis, subtus nitidis, nervo medio et duobus intramarginalibus validioribus, nervis secundariis utrinque 1—2; spadicibus femineis infra frondes erecto-patentibus, spathis jam inter florescentiam exaridis, simpliciter ramosis, ramis 6—8 erectis, floribus depressis, ovalibus, ovariis subglobosis, viridulis, rudimentis staminum nullis; ramis spadicis, calycibus petalisque flavescentibus.

Plantam masculam non vidi.

Patria: N. Granada.

Caudex diametro 5—6 lin., annulis 3—4 poll. distantibus. Frondes 3—3 $\frac{1}{2}$ ped. longae, vagina 9—11 poll., petiolo 5—6 poll., rhachi 14—15 poll., pinnis 10—11 poll. longis, 2 $\frac{1}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$ poll. latis.

Indidi huic speciei nomen F. Bartling, Phil. Dr., universitatis Gottingensis decoris et ornamenti, acerrimi ingenii botanici, praeceptoris mei carissimi.

18. *Ch. brevifrons* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus patentibus, pinnatis, viridibus, vaginis cylindricis apice longe apertis, auriculatis, petiolis brevibus obtuse trigonis, basi supra callosis, rhachi supra acutangula, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida notatis, pinnis utrinque 6—8 subaequidistantibus, alternis, oblongo-lanceolatis, falcatis, basi contractis, acuminatis vel abrupte acuminatis, apicibus pendulis, summis confluentibus, nitidis, nervo medio et duobus intramarginalibus validioribus, nervis secundariis utrinque 3; spadicibus masculis infra frondes erecto-patentibus, spathis apicem versus inter florescentiam exaridis,