

14. ? *Ch. fragrans* Mart. Hist. II. p. 4, t. 3 fig. 1 et 2. Kunth Enum. III. p. 172 no. 7. *Nunnezharia fragrans* Ruiz. et Pav. Prodr. flor. per. et chil. p. 137 t. 31. Eorund. Syst. veg. flor. per. et chil. p. 294. *Nunnezia fragrans* Willd. spec. plant. IV. 2 p. 1154.

bb. Frondes pinnati.

α. pinnis extimis erecto-patentibus.

15. *Ch. Lindeniana* Hrm. Wendl. in Otto et Dietr. Gartenz. 1853 no. 18 p. 139.

16. ? *Ch. flavovirens* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnatis, flavovirentibus, vaginis cylindricis apice paululo apertis et subauriculatis, petiolis subrotundis, basi supra callosis, evanescente applanatis, rhachi supra subrotunda, vagina, petiolo rhachique dorso fascia albida distincte notatis, pinnis remotis utrinque 6—7, oblongis, falcatis, basi contractis, acuminatis, apicibus pendulis, summis confluentibus, nervis primariis et secundariis 7—9.

Patria ignota.

Caudex diametro 7—9 lin., annulis 4—5 poll. distantibus. Frondes $3\frac{1}{2}$ —4 ped. longae, vagina 8—10 poll., petiolo 5—7 poll., rhachi 2 ped., pinnis 10—11 poll. longis, 3— $3\frac{1}{2}$ poll. latis.

Species fronde similis quidem est *Ch. lunatae* Liebm., *Ch. concolori* Mart. et *Ch. Lindenianae* mihi, sed ex iis sat distincta. Inflorescentiam nondum vidi, itaque ejus characteres serius exponendi sunt.

17. ? *Ch. Bartlingiana* sp. n. Caudice erecto, remote annulato; frondibus erecto-patentibus, pinnatis, glaucescentibus, vaginis basi cylindricis, apice oblique longeque apertis, subauriculatis, in petiolum teretiusculum supra applanatum vel paulo cana-