

poda Kurz in Journ. As. Soc. Beng. XLIII, II (1874) 205, t. XV.

Isole Andaman; Giava; Celebes, ed in altre isole malesi; Filippine; Nord Australia.

6. **C. microclada** Becc. sp. n. Vide *Corypha elata* in Philip. Journ. Sci. XIV (1919) 391. — Minor, paniculae ramis brevibus, spathiferis, ramulis fructiferis brevissimis, 4-5 cm. longis; fructibus sphaericis, 15-17 mm. diam., pedicello 3-4 mm. longo suffultis.

Filippine, nell'Isola di Biliran: *Mac Gregor* n.º 18720. Erb. di Manilla e Beccari.

7. **C. Careyana** Becc. sp. n. — Penultimi paniculae rami in 3-5 approximatos, circiter 60 cm. longos, floriferos ramulos, divisi. Flores super pulvinulos subdepressos, anguste ellipticos, congesti; calyce breviter acuteque trilobo; ovario turbinato, apice conico et abrupte in stylum brevem, in alabastro antheris brevior, attenuato.

L'esemplare tipico è il n.º 8615 di Wallich, che porta l'indicazione: Ex horto beati Guil. Carey, Febr. 1828 (in Saharanpur?).

Specie certamente indiana, ma di provenienza ignota.

8. **C. Griffithiana** Becc. sp. n. — Penultimi paniculae rami in plurimos, erectos, rigidos, floriferos ramulos, divisi. Flores super pulvinulos elevatos glomerulati; calyce obconico, subtruncato, obscure 3-denticulato; ovario in stylum subulatum, antheris in alabastro longior, sensim attenuato.

Arcipelago di Mergui o Costa del Tenasserim (Birmania). L'esemplare tipico è il n.º 76, distribuito da Hooker f. e Thompson. (Erb. di Parigi).

SPECIE DUBBIE.

C. sylvestris Bl. Rumphia, II, 59 = *C. elata* Roxb.? Celebes.

C. macropoda Kurz in Journ. As. Soc. Bengal, XLIII, II (1874) 205, t. XV. = *C. elata* Roxb.?

Isole Andaman.