

11. **Aiphanes Eggersii** Burret nov. spec. — Palma 3 m alta. Frondis rhachis aculeis nigris, longis, visis usque ad 5 cm longis, ut videtur, sparsim armata, subtus albo-furfuraceo-tomentosa, setis minutis, paucis inspersis. Segmenta frondis apice in lobos 2 multinervos, rhachin secus 11 cm, apice usque ad 15 cm latos confluentia, sequentia uninervia, ut videtur, irregulariter, per greges disposita, sat anguste cuneiformia, visa ad 22 cm longa, ad 5 cm apice lata, apice irregulariter praemorsa et marginibus haud vel sat obscure lateque productis, supra inermia et glabra, margine brunneo-setulosa, subtus paulo pallidiora, in facie primo pilis parvis hirsutula, mox glabrata, in costa media aculeis longis, remotis armata. Spadix pro rata parvus. Spatha superior in parte libera 22 cm longa, extus albo-tomentosa et aculeis fere setiformibus, nigris, plerumque 1 cm circ. longis, saepe, ut videtur, delapsis armata, apice acuminata. Spadicis pars ramosa 20 cm circ. longa, ramis pro rata haud numerosis, dense sequentibus, parvis. Rhachis ut rami aculeis setisque carentes. Rami circ. 5—10 cm longi, ad florum insertiones valde flexuosi, sat robusti. Florum glomeruli densi, in parte inferiore ramorum 3-flori, axi infra vix producta, flores ♂ bini femineo superpositi, dein ♂ bini vel apicem versus ♂ solitarii. Flores ♂ parvi, humiles, plerumque vix longiores quam lati, apice rotundati vel, saepe obscure, apiculati, non acuminati. Sepala tenuia, basi vix producta, ceterum ecarinata, ovata vel ovato-oblonga. Petala late ovata vel ovata, saepe plus minus obscure acutiuscula, non acuminata, nervis longitudinalibus omnino inconspicuis. Stamina 6, libera. Filamentum sat breve. Antherae oblongae, sed pro rata breves. Pistillodium gibbosum. Flores ♀: Sepala latissime ovata. Corolla basi connata, lobis valvatis, latiuscule triangularibus, apice haud productis. Cupula staminodialis 6-dentata, dentibus anguste productis. Gynaeceum inerme, glabrum.

Ecuador: El Recreo. 3 m hohe Palme an trockenen Standorten. Früchte eßbar, rot. Eingeborenennamen „Corozo“ (blühend 14. Februar 1897 — EGGERS n. 15480).

Die Art erinnert an *A. truncata*, jedoch sind bei *A. truncata* die männlichen Blüten wesentlich länger als breit und stark zugespitzt, die dichten Längsnerven ihrer Blumenblätter sind erkennbar, ihrer Spatha fehlt der Filz, die Achse unter den Blütengruppen ist stark vorgezogen, der obere Teil der Äste ist zierlicher.

Subgenus 2. **Brachyanthera** Burret subgen. nov. — Florum glomeruli, praecipue flores ♀, in axin nonnihil immersi. Flores ♂ plerumque humiles, saepe latiores quam alti, apice rotundati, sepala